

遠方單驗土



明弘治

土 验 单 方 选

丹东市卫生局《土验单方选》编辑组

救死扶傷
革命的人道主義
—— 白求恩

毛主席语录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

说 明

一、药物计量单位：以国际公制（即米制）为准，每斤10两，每两10钱，每斤500克，每两50克，每钱5克，每分0.5克。液体药物按每斤500毫升，每两50毫升，每钱5毫升计算。

二、药物除处方规定用“生”、“鲜”外，均宜用加工炮制品，特别是乌头、附子、南星、半夏等毒性大的药物，必须加工炮制，减少毒性，保证安全。

三、药物剂量除说明外，均为成人量。应根据患者年龄大小、病情轻重、体质强弱酌情应用。对毒剧药物，如：巴豆、川乌、草乌、南星等参照毒剧药品参考表慎重应用，保证安全。

为适应防治疾病的需要，巩固发展合

作医疗制度，一九七〇年搜集出版了《土验单方选》第一册。几年来，赤脚医生、医药卫生工作人员，遵照伟大领袖和导师毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的教导，在防治疾病过程中，筛选验证了大量的资源广、疗效好、质量高的方剂。丹东市药检所负责对这些方剂进行了搜集工作，现将搜集到的土验单方之一部分汇编成册，推荐给赤脚医生、医药卫生工作人员参考试用。在应用中有什么意见和在临床上又筛选出哪些好的方剂，望以书面反映给我们，供今后研究出版。

编者

一九七六年十一月

目 录

防治药方

预防流感方.....	(1)
预防流脑方.....	(10)
预防乙脑方.....	(15)
预防猩红热方.....	(17)
预防百日咳方.....	(18)
预防出血热方.....	(19)
预防传染性肝炎方.....	(23)
预防麻疹方.....	(27)

外科疾病

痈疽恶疮.....	(30)
带状疱疹.....	(50)
外伤出血.....	(57)
癣 症.....	(61)

跌打损伤.....	(70)
烧烫伤.....	(77)
治蛇咬伤.....	(86)
皮肤科.....	(92)
冻 伤.....	(105)
乳腺炎类.....	(106)
脚 气.....	(118)
治疗脚鸡眼方.....	(122)
脉管炎.....	(123)
肠梗阻.....	(123)
痔 疮.....	(124)

五 官 科

中耳炎.....	(127)
鼻 炎.....	(131)
口腔溃疡.....	(132)
扁桃腺炎.....	(133)
结膜炎.....	(142)

眼珠扎刺.....	(142)
-----------	---------

内 科 疾 病

慢性气管炎.....	(144)
支气管哮喘.....	(154)
咳 嗽.....	(155)
肺内感染.....	(158)
坐骨神经痛.....	(167)
风湿症.....	(171)
半身不遂.....	(182)
面神经麻痹.....	(184)
胃 痛.....	(186)
溃疡病.....	(189)
肠 炎.....	(199)
便 秘.....	(203)
痢 疾.....	(204)
肝 炎.....	(215)
肾 炎.....	(220)

肾盂肾炎.....	(224)
腹 水.....	(226)
水 肿.....	(227)
胆囊炎、胆石症.....	(229)
胆道蛔虫.....	(229)
驱 虫.....	(232)
头 痛.....	(233)
神经性头痛.....	(235)
偏头痛.....	(237)
风热头痛.....	(238)
牙 痛.....	(239)
吐 血.....	(243)
各种出血.....	(244)
尿毒症.....	(247)
尿潴留.....	(248)
尿潴留.....	(249)
神经衰弱.....	(256)
癲 癇.....	(259)
高血压.....	(259)

遗 精.....	(259)
眩晕症.....	(261)
淋巴、骨结核.....	(261)

妇 产 科

子宫功能性出血.....	(268)
因寒痛经.....	(272)
寒性腰腿痛.....	(273)
产后流血不止.....	(274)
产后四肢麻木.....	(275)
产后缺乳.....	(276)
产后支气管炎.....	(276)
阴道滴虫.....	(277)

儿 科

小儿惊风.....	(279)
小儿消化不良.....	(280)
夜尿症.....	(285)

小儿脱肛.....	(288)
蛲虫病.....	(290)
小儿疝气.....	(292)
小儿胎毒.....	(293)
腮腺炎.....	(295)

毒剧药品参考表

毒 药.....	(300)
剧 药.....	(304)

中草药采集季节参考表

春季采集的中草药.....	(308)
夏季采集的中草药.....	(310)
秋季采集的中草药.....	(313)
冬季采集的中草药.....	(316)
各季采集的中草药.....	(317)

预 防

预 防 流 感 方

—

〔处方〕 食 醋 适量

〔制法〕 将食醋加水稀释 1 倍，置容器中，加热使其蒸发。

〔用途〕 用于室内空气消毒，预防流感。

〔用法〕 熏蒸，每立方米用 3~5 毫升食醋加水稀释 1 倍，放在容器内，加热使其蒸发，或用旧布蘸醋放在暖气上蒸发。熏蒸时将门窗关闭。在流行期，每日一次。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

二

〔处方〕 苍 术 60克
艾 叶 15克
粘木粉 54克
粘合剂 9克
氯酸钾 适量
香 料 适量
制 成 150克

〔制法〕 先将苍术、艾叶粉碎与粘木粉、香料、氯酸钾混匀，加粘合剂制成软材，搓成细条，盘成蚊香形式，每盘15克，干燥即可。

〔用途〕 用于室内空气消毒，预防流感。

〔用法〕 室内点香，一般25~35平方米面积不宜超过2~3盘。点燃时间为6~8小时。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

三

〔处方〕 贯众 1500克

〔制法〕 将贯众切碎，加水煎煮3次，每次1小时，过滤，合并3次滤液，浓缩成1500毫升，为100人的1天量。

〔用途〕 用于预防流感。

〔用法〕 内服，流行期间，每人每次7.5~8毫升，日服2次。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟公社社办医疗站，东沟县向阳公社社队联办总站、丹东市卫生防疫站。

〔注〕

1、我地区所用的贯众为鳞毛蕨科植物粗茎鳞毛蕨 *Dryopteris Crassirhizoma Nakai* 的干燥根状茎。

2、在流脑流行期间，亦可将贯众放

水缸中,每担水可放贯众500克。



〔处方〕 板兰根 3000克

〔制法〕 将板兰根切碎,加水煎煮3次,每次1小时,过滤,合并3次滤液,浓缩成3000毫升,为100人的1天量

〔用途〕 用于预防流感。

〔用法〕 内服,每次每人15毫升,日服2次。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟公社社办医疗站,东沟县向阳公社社队联办总站,丹东市卫生防疫站。

五

〔处方〕 大青叶 2500~5000克

板兰根 2500~5000克

〔制法〕 将大青叶、板兰根切碎,

加水煎煮3次,每次1小时,过滤,合并3次滤液,浓缩成2500~5000毫升,为100人份1天量。

〔用途〕 用于预防流感。

〔用法〕 日服1次,每次25~50毫升,连服3~5天。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟公社社办医疗站,东沟县向阳公社社队联办总站,丹东市卫生防疫站。

六

〔处方〕 紫花地丁 25~50克

〔制法〕 将紫花地丁洗净除去杂质,切成饮片。

〔用途〕 用于预防流感。

〔用法〕 将上述切好的饮片,放入茶杯中,用开水冲泡数分钟后,当茶饮。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

七

〔处方〕 紫 苏 15克
荆 芥 15克
鲜芦根 25克

〔制法〕 将上述3味药，洗净切碎，加水煎煮2次，每次20分钟，共为1次量。

〔用途〕 用于预防流感。

〔用法〕 内服，每日1次，连服5~7天。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

八

〔处方〕 白茅根 25克
鲜萝卜 100克

〔制法〕 将白茅根、鲜萝卜切碎，水煎服。

〔用途〕 用于预防流感

〔用法〕 内服，日服2次，连服4天。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

九

〔处方〕 野菊花 15克
桑 叶 15克

〔制法〕 将野菊花、桑叶加水煎煮。

〔用途〕 用于预防流感。

〔用法〕 内服，当茶饮。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

十

〔处方〕 野菊花 500克
桑 叶 900克

〔制法〕 将野菊花、桑叶，加水煎煮3次，每次30分钟，过滤，合并3次滤

液，浓缩成1400毫升。为100人份1天量。

〔用途〕 用于预防流感。

〔用法〕 每人每次14毫升，日服1

次。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟公社社办医疗站，东沟县向阳公社社队联办总站，丹东市卫生防疫站。

十一

〔处方〕	野菊花	200克
	柴 胡	200克
	细 辛	100克
	羌 活	200克

〔制法〕 将野菊花、柴胡、细辛、羌活洗净，干燥粉碎，放入蒸馏瓶内，加水浸泡1小时，然后加热蒸馏，收集初馏液1000毫升，将初馏液再次蒸馏，收集精馏液700毫升，过滤澄明，分装，100℃30

分钟灭菌，检查，印字。

〔用途〕 用于流感。

〔用法〕 肌肉注射，每日2次，每次2~4毫升。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社后地大队医疗站。

十二

〔处方〕	野菊花	500克
	柴 胡	200克

〔制法〕 将上述药洗净，干燥，粉碎，装入蒸馏瓶中，加水浸泡1小时，加热蒸馏。收集初馏液1000毫升，将初馏液再次蒸馏，收集精馏液700毫升，过滤澄明，分装，100℃30分钟灭菌，检查，印字。

〔用途〕 用于流感。

【用法】 口服，每日2次，每次20毫升。

【处方来源】 丹东市卫生防疫站。

三 时 疫 散

【处方】 大青叶 50克
板蓝根 50克

【制法】 将上述2味药洗净，切

【用法】 口服，将上述水煎液，当茶饮。

【处方来源】 丹东市卫生防疫站。

二

【处方】 金银花 10克
连翘 10克

【用法】 将上述2味药加水煎煮2次，每次30分钟，过滤，合并2次滤液，当茶饮。

【处方来源】 丹东市卫生防疫站。

三

【处方】 板蓝根 100克。

【制法】 将板蓝根洗净，粉碎，加水煎煮2次，每次30分钟，过滤，合并2次滤液，当茶饮。

【用法】 口服，将上述水煎液，当茶饮。

【处方来源】 丹东市卫生防疫站。

〔用法〕 内服，日服2次，每次50毫升，连服1周。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

四

〔处方〕 大青叶 25克
板兰根 25克
生甘草 15克

〔制法〕 将上述3味药洗净，去杂质，切成饮片，混匀，分成3~5份，晒干备用。

〔用途〕 用于预防流脑。

〔用法〕 内服，日服2次，每日煎服1份。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

五

〔处方〕 狗奶子根 50克

〔制法〕 将狗奶子根洗净，切碎，加水煎煮3次，每次1小时，过滤，合并3次滤液，浓缩成100毫升。

〔用途〕 用于预防流脑。

〔用法〕 喷咽或滴鼻，连用5~7天。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟公社社办医疗站，东沟县向阳公社社队联办总站，丹东市卫生防疫站。

六

〔处方〕 黄柏 50克

〔制法〕 将黄柏洗净，切碎，加水煎煮3次，每次30分钟，过滤，合并3次滤液，浓缩成100毫升。

〔用途〕 用于预防流脑。

〔用法〕 喷咽或滴鼻，连用5~7天。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟公社社办医疗站，东沟县向阳公社社队联办总站，丹东市卫生防疫站。

七

〔处方〕 山豆根 50克

〔制法〕 将山豆根洗净，切碎，加水煎煮3次，每次30分钟，过滤，合并3次滤液，浓缩成100毫升。

〔用途〕 用于预防流脑。

〔用法〕 喷咽或滴鼻，连用5~7天。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟公社社办医疗站，东沟县向阳公社社队联办总站，丹东市卫生防疫站。

〔注〕 我地区用的山豆根为，防己科植物蝙蝠葛 *Menispermum dauricum* DC. 的根或根状茎。

预防乙脑方

一

〔处方〕 黄芩 10克
狗奶根 10克
鸭跖草 10克

〔制法〕 将上述3味药洗净，切碎，加水煎煮3次，每次1小时，过滤，合并3次滤液，浓缩成20毫升。

〔用途〕 用于预防乙脑。

〔用法〕 内服，每次20毫升，日服1次，连服3~5天。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

二

〔处方〕 大青叶 50克
板兰根 50克

【用法】 将本品洗净，切
碎，加水煎2次，每次30分钟，过滤，合
并2次滤液，浓缩至50%。

【用法】 将本品洗净，切
碎，加水煎2次，每次30分钟，过滤，合
并2次滤液，浓缩至50%。

【用法】 将本品洗净，切
碎，加水煎2次，每次30分钟，过滤，合
并2次滤液，浓缩至50%。

三

【处方】 本品 50克

【用法】 将本品洗净，切碎，水
煎。

【用法】 将本品洗净，切碎，水
煎。

【用法】 将本品洗净，切碎，水
煎。

人，隔10天再服3。

【用法】 将本品洗净，切碎，水
煎。

【用法】

1、本品为水煎液，其性味甘、平。

Eleusine indica (L.) Gaertn的全草。

2、别名：蟋蟀草，路边草，鸭脚
草，蹲倒驴，牛顿草，千人路。

3、生境：生于旷野，路边。

4、采集：夏、秋季采，洗净晒干。

预方红热方

一

【处方】 本品 15克

【用法】 将本品洗净，切碎，水煎。

【用法】 将本品洗净，切碎，水
煎。

【用法】 将本品洗净，切碎，水
煎。

日。

【用法】 将本品洗净，切碎，水
煎。

二

【处方】 本品 适量

煎。
〔制法〕 将狗奶根洗净，切碎，水

〔用途〕 用于预防猩红热。

〔用法〕 内服，当茶饮。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

三

〔处方〕 银翘解毒丸

〔用途〕 用于预防猩红热。

〔用法〕 内服，一次半丸至一丸，
日服3次。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

百日咳预防方

一

〔处方〕 独头蒜 2个

白菜根 50克

糖 适量

〔制法〕 将独头蒜（或大蒜适量）
捣开，白菜根切碎，水煎，加糖适量。

〔用途〕 用于预防百日咳。

〔用法〕 内服，当茶饮。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

预防出血热方

一

〔处方〕 萝卜 500克

双花 25克

绿豆 200克

〔制法〕 先将萝卜切碎与双花共加
水煎10~20分钟，再加绿豆继续煎煮10~
30分钟即可。

〔用途〕 用于预防出血热。

〔用法〕 内服，吃萝卜喝汤，每日

1次，连服2~3天。剩余绿豆可加米做饭吃。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

二

〔处方〕 公英 25克
紫花地丁 25克
车前草 25克

〔制法〕 将上述3味药洗净，切碎，水煎服。

〔用途〕 用于预防出血热。

〔用法〕 内服，日服2次，连服5~7天。从流行季节前服至流行期结束为止。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

三

〔处方〕 沙参 15克
地榆 15克

〔制法〕 将上述2味药洗净，切碎，水煎服。

〔用途〕 用于预防出血热。

〔用法〕 内服，日服2次，连服2天，每隔半月再服2天。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

四

〔处方〕 大青叶 50克
板蓝根 50克
败酱草 50克
白茅根 50克

〔制法〕 将上述4味药洗净，切碎，水煎服。

〔用途〕 用于预防出血热。

〔用法〕 内服，每日1剂，分2次服，每周服1~2剂。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

五

〔处方〕 大青叶 25克
野菊花 25克

〔制法〕 将上述2味药洗净，切碎，水煎服。

〔用途〕 用于预防出血热。

〔用法〕 内服，日服1次，连服3天。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

六

〔处方〕 贯众 适量

〔制法〕 将贯众洗净，置水缸中浸泡。

〔用途〕 用于预防出血热。

〔用法〕 内服，饮浸泡贯众的水。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

预防传染性肝炎方

一

〔处方〕 鲜垂柳嫩枝叶 25~50克

〔制法〕 将上述药洗净，切碎，水煎服。

〔用途〕 用于预防传染性肝炎。

〔用法〕 内服，每日1剂，分2次服，连服7天。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

二

〔处方〕 茵陈 50克

黄柏 15克

车前子 15克

〔制法〕 将上述3味药洗净，水煎服。

〔用途〕 用于预防传染性肝炎。
〔用法〕 内服，每日1剂，分2次服，连服5~7天。
〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

三

〔处方〕 茵陈 15克
郁金 15克
〔制法〕 将上述二味药洗净，水煎服。
〔用途〕 用于预防传染性肝炎。
〔用法〕 内服，每日1剂，分2次服，连服3天。
〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

四

〔处方〕 茵陈 50克
玉米须 50克

〔制法〕 将上述2味药水煎服。
〔用途〕 用于预防传染性肝炎。
〔用法〕 内服，每日1剂，分2次服，连服3~5天。
〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

五

〔处方〕 鲜马齿苋 50克
甘草 10克
〔制法〕 将上述2味药洗净，切碎，水煎服。
〔用途〕 用于预防传染性肝炎。
〔用法〕 内服，每日1剂，分2次服，连服7天。
〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

六

〔处方〕 山葡萄根 25克

〔制法〕 将山葡萄根洗净，切碎，加水煎服。
 〔用途〕 用于预防传染性肝炎。
 〔用法〕 内服，每日1剂，分2次服，连服5天。
 〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

七

〔处方〕 茵陈 25克
 板蓝根 25克
 〔制法〕 将上述2味药洗净，水煎服。
 〔用途〕 用于预防传染性肝炎。
 〔用法〕 内服，每日1剂，分2次服，连服7天。
 〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

预 防 麻 疹 方

一

〔处方〕 金银花 15克
 板蓝根 15克
 〔制法〕 将上述2味药洗净，水煎服。
 〔用法〕 内服，每日1剂，分2次服，连服3天。
 〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

二

〔处方〕 金银花 50克
 板蓝根 50克
 〔制法〕 将上述二味药洗净，水煎服。
 〔用途〕 用于预防麻疹。

〔用法〕 内服，1日量，连服3天
或加糖当茶饮。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

三

〔处方〕 紫 草 25克

甘 草 25克

〔制法〕 将上述2味药洗净，水煎服。

〔用途〕 用于预防麻疹。

〔用法〕 内服，日服1次，连服6天。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

四

〔处方〕 紫 草 5克

甘 草 5克

贯 众 15克

〔制法〕 将上述3味药洗净，水煎服。

〔用途〕 用于预防麻疹。

〔用法〕 内服，每日1剂，分2次服，连服5天。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

五

〔处方〕 贯 众 20克

南瓜根 20克

〔制法〕 将上述2味药洗净，切碎，水煎服。

〔用途〕 用于预防麻疹。

〔用法〕 内服，日服1次，连服2~5天。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

外科疾病

痈 疽 恶 疮

一

〔处方〕 马齿苋 500克
明 矾 150克

〔制法〕 将上述2味药捣烂，调粘即可。

〔用途〕 无名肿毒。

〔用法〕 外用，取适量敷患处，每日1次。

〔临床疗效〕 该站临床应用20多例患者，均取得显著疗效。

〔处方来源〕 市郊区鸭绿江公社珍珠大队医疗站。

二

〔处方〕 活麻雀 1个

〔制法〕 活麻雀不准见铁器，用手或竹刀将肚子扒开，不去内脏，趁热敷在患处即可。

〔用途〕 治疗痈疽。

〔用法〕 将麻雀肚子扒开，趁热敷在患处，1次1个。

〔临床疗效〕 该院临床应用多例，效果显著。

〔处方来源〕 凤城县红旗公社医院。

三

〔处方〕 生石膏 1000克
黄 柏 500克

〔制法〕 将上述2味药研细，用开

白水调成膏状备用。

〔用途〕 用于痈疽、红肿未溃者。

〔用法〕 外用，将调膏敷于患处即可。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果显著。

〔处方来源〕 凤城县草河公社医院。

四

〔处方〕 干姜 5克

胡椒 5克

老头草根 5克

〔制法〕 将上述3味药，共为细末，加水3碗煎煮，煎成半碗即可。

〔用途〕 用于多发性疔肿、搭背、疔等。

〔用法〕 口服，连药面代汤一块服

下，红糖为引，出汗。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县石庙公社大沟大队医疗站。

〔注〕 该方剂亦可治疗跌打损伤、闪腰岔气等症。

五

〔处方〕 生大黄 150克

巴豆霜 150克

雄黄 150克

〔制法〕 将上述3味药，以米醋泛糊丸，每丸似小豆粒大小。

〔用途〕 用于疔、疮等症。

〔用法〕 内服，每日1次，成人每次6丸。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效

果很好。

〔处方来源〕 凤城县草河公社医院。

〔注〕

1、服药后有腹泻，为正常现象。

2、服药期间，忌辛、辣、小米饭等食物。

3、个别患者，服药后有心烦、恶心等副作用。

六

〔处方〕 螫麻子根 适量

〔制法〕 将鲜螫麻子根洗净，捣烂备用。

〔用途〕 用于疔、疮。

〔用法〕 外用，将捣烂的鲜螫麻子根敷于患处即可。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效

果很好。

〔处方来源〕 岫岩县石庙子公社医院。

七

〔处方〕 银 珠 0.5克
白 矾 5克

〔制法〕 将上述 2 味药，共为细末。

〔用途〕 用于疔、疮。

〔用法〕 内服，上述药分早晚 2 次，蜂蜜水送服。

〔临床疗效〕 该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 宽甸县夹皮沟公社医院。

八

〔处方〕 黄柏豆 1500克
鸭跖草 500克

〔制法〕 将上述2味药洗净，加10倍量水，煎煮2小时，过滤，滤液浓缩成稠膏状，备用。

〔用途〕 用于一般疮疖、无名肿毒。

〔用法〕 外用，疮面清洗后，将药膏涂在油纸上，贴在患处。

〔临床疗效〕 经该站3~4年的临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县沙里寨公社亮子河医疗站。

九

〔处方〕 生天南星 适量

〔制法〕 取新鲜的生天南星适量，捣烂备用。

〔用途〕 用于疔肿未溃者。

〔用法〕 外用，将捣烂的天南星敷于患处即可。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县前营子公社燕窝大队医疗站。

十

〔处方〕 山核桃 4~5个

〔制法〕 将整个的山核桃置于火盆中烧着，移入罐头瓶中，瓶口上套一圆锥型纸罩（酱帽子型），纸罩的顶端剪一圆锥型小孔，使瓶内燃烧的核桃烟集中由小孔放出即可。

〔用途〕 用于疔肿。

〔制法〕 将罐头瓶纸罩的小孔对准患部，用烟熏，至核桃燃尽烟无为止，每日1~2次。必要时可连续熏2~3遍为1次。

〔临床疗效〕 经青山沟各医疗站及地区医院临床应用，效果明显。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟公社地区医院。

十一

〔处方〕 黄 柏 500克
蒲公英 250克
苦 参 250克

〔制法〕 将上述3味药洗净，加水煎煮2次，每次1~1.5小时，过滤，合并2次滤液，浓缩成膏状。

〔用途〕 用于疮疖成脓未溃者。

〔用法〕 外用，将浓缩膏涂于患处

或将膏涂于油纸上敷于患处即可。
〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县沙里寨公社诗雅甸医疗站。

十二

〔处方〕 乳 香 10克
没 药 10克
铜 绿 10克
蟾 酥 5克
冰 片 5克
淀 粉 5克
朱 砂 5克

〔制法〕 先将乳香、没药（未泡者）分别置锅中微火炒黄去油，共为细粉，备用。再取蟾酥捣碎，加酒拌匀后放置至呈灰白色粥状，晒干与冰片共为细

末，备用。再将铜绿研成细粉与上述2种备用粉混匀，加淀粉和乳汁（牛乳）制成绿豆粒大小丸剂，朱砂为衣即得。

〔用途〕 用于疗毒、疔肿、急性乳腺炎、急性扁桃腺炎等症。

〔用法〕 内服，成人每次4~6粒，小儿酌减，每日2次，黄酒送服，服后发汗（热退者不须再发汗），饭后服。

〔临床疗效〕 该站从一九七〇年开始作为临床常用药，经治100余例患者效果良好。

〔处方来源〕 市郊区五龙背医疗站。

〔注〕 热退后和病情减轻时或用量过多者，有时出现轻微恶心、腹痛、腹泻。

十三

〔处方〕 蝎子 3个

〔制法〕 将蝎子放在豆油中炸好为末。

〔用途〕 用于疮疖。

〔用法〕 内服，顿服。

〔临床疗效〕 该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 东沟县马家店公社西尖山医疗站。

十四

〔处方〕 生杏仁 15克
轻粉 1.5克
大葱白 3寸

〔制法〕 先将生杏仁和大葱白捣烂，加轻粉用蜂蜜调成膏即得。

〔用途〕 用于疔疽初期。

〔用法〕 外用，取适量药膏涂于患处即可。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 凤城县草河公社管家大队医疗站。

十五

〔处方〕 柳树叶 1500克
楸树根皮 750克

〔制法〕 将上述 2 味药洗净，加水煎煮 3 次，每次煮沸 1 小时，过滤，合并 3 次滤液，浓缩成调膏状即得。

〔用途〕 用于疮疖初期，无名肿毒。

〔用法〕 将药膏涂于患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟公社榆树大队医疗站。

十六

〔处方〕 鲜楸树根皮 1000克
面碱 50克

〔制法〕 先将楸树根皮洗净，用水煎煮 3 次，每次煮沸 1 小时，过滤，合并 3 次滤液，浓缩成稠膏状，加入面碱搅匀。

〔用途〕 用于疮疖初期，无名肿毒。

〔用法〕 外用，将药膏涂于患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟公社滴水砬子大队医疗站。

十七

〔处方〕 黄柏 100克

生石膏 150克

〔制法〕 将上述 2 味药共为细末，用凡士林调膏即得。

〔用途〕 用于疔肿未溃者。

〔用法〕 外用；涂患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 东沟县向阳公社羊山子医疗站。

十八

〔处方〕 黄 柏 500克

南 星 100克

细 辛 25克

〔制法〕 将上述 3 味药，共为细粉。

〔用途〕 用于无名肿毒、疮疖未溃者。

〔用法〕 外用，取适量用黄酒调敷患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 东沟县向阳公社卧龙大队医疗站。

十九

〔处方〕 野鸡脖蛇 1 条

〔制法〕 将野鸡脖蛇，用瓦片焙黄研面。

〔用途〕 用于颈痈、多发性疔肿。

〔用法〕 内服，每日 3 次，每次 2.5 克。用黄酒送服，服后发汗。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社木家岭大队医疗站。

二十

〔处方〕 野菊花 500克
豆 油 适量

〔制法〕 用豆油炸野菊花（最好用纱布将野菊花包好炸），野菊花炸枯后取出，用炸野菊花油做纱布块、条，备用。

〔用途〕 用于化脓性感染。

〔用法〕 外用，将制好的纱布块、条敷于患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果显著。

〔处方来源〕 站岩县偏岭公社后地大队医疗站。

二十一

〔处方〕 海螵蛸 25克
甘 草 25克

〔制法〕 将上述2味药，加水适量，煮沸。
〔用途〕 用于化脓性指头炎。
〔用法〕 将上述煮沸的药水，稍温后，将患指插入药液中浸泡，待药液凉时为止，药液可反复多次使用。
〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 东沟县长安公社佛老大队医疗站。

二十二

〔处方〕 猪 胆 1个

〔制法〕 取新鲜猪胆，剪去外面的异物即可。

〔用途〕 用于化脓性指头炎。

〔用法〕 外用，将剪去表面异物的新鲜猪胆，套在患指上即可。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县沙里寨公社地区医院。

二十三

〔处方〕 卤 水 250毫升
小黄瓜 100克

〔制法〕 将卤水放入瓷坛内，再装入小黄瓜浸泡半个月后，即可使用。

〔用途〕 用于化脓性指头炎。

〔用法〕 外用，将浸泡好的卤水涂于患指。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 凤城县鸡冠山公社医院。

二十四

〔处方〕 蒲公英 500克

〔制法〕 取蒲公英加水2000毫升煎煮，最后煎成1000毫升，过滤去渣。

〔用途〕 用于化脓性感染。

〔用法〕 外用，可代替雷夫奴尔，制成敷料，敷于患处。

〔临床疗效〕 为该院常用药之一，临床效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

二十五

〔处方〕 红 花 500克

大 黄 500克

丹 皮 500克

赤 芍 500克

〔制法〕 将上述4味药，加水煎

煮，最后煎成10000毫升。

〔用途〕 用于化脓性感染。

〔用法〕 外用，可代替雷夫奴尔，制成敷料，敷于患处。

〔临床疗效〕 为该院常用药之一，临床疗效很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

带 状 疱 疹

一

〔处方〕 白 矾 15克

雄 黄 15克

〔制法〕 将上述2味药共为细粉。

〔用途〕 用于带状疱疹。

〔用法〕 外用，用香油调敷患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 东沟县长山公社医

院。

二

〔处方〕 铁 锈 适量

〔制法〕 将废铁锈刮下，研成极细粉末，过100目筛即得。

〔用途〕 用于带状疱疹。

〔用法〕 外用，用水将铁锈细粉调匀敷于患处即可。

〔临床疗效〕 该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 东沟县新农公社四家子医疗站。

三

〔处方〕 铁 锈

香 油 适量

〔制法〕 将废铁锈刮下，研成极细粉末，过100目筛，用香油适量调成糊状即得。

〔用途〕 用于带状疱疹。

〔用法〕 外用，将调好的细铁锈敷于患处即可。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 宽甸县八河川公社地区医院。

四

〔处方〕 雄 黄 15克

冰 片 1克

〔制法〕 将上述2味药共为细粉，用香油(或其他植物油类)调成糊状即得。

〔用途〕 用于带状疱疹。

〔用法〕 外用，敷于患处即可。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县沙里寨公社盖家大队六小队医疗站。

〔注〕 在外敷上方同时，可再加去头足的蜈蚣1条剪碎，用豆油炸鸡蛋吃，每日1次，连服3次即可治愈。

五

〔处方〕 雄 黄 15克

蜈 蚣 1条

〔制法〕 将上述2味药共为细末，加白酒50毫升，浸泡2小时即可。

〔用途〕 用于带状疱疹。

〔用法〕 外用，将上述药液擦患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 市郊区楼房公社医

六

〔处方〕 雄 黄 适量

食 醋 适量

〔制法〕 先将雄黄研成细粉，用食醋调成糊状。

〔用途〕 用于带状疱疹。

〔用法〕 外用，涂患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社丰富大队医疗站。

七

〔处方〕 雄 黄 适量

白 酒 适量

〔制法〕 将雄黄研成粗粉，用纱布

包好，放入适量的白酒中浸泡数小时即可。

〔用途〕 用于带状疱疹未溃者。

〔用法〕 外用，将浸好的酒涂擦患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社小偏岭大队医疗站。

八

〔处方〕 雄 黄 15克

香 油 适量

〔制法〕 将雄黄研成细粉，用香油调成糊状。

〔用途〕 用于带状疱疹。

〔用法〕 外用，敷患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 市郊区鸭绿江公社珍珠大队医疗站。

九

〔处方〕 旱烟叶 适量

〔制法〕 将旱烟叶用水泡透。

〔用途〕 用于带状疱疹。

〔用法〕 外用，将泡透的旱烟叶贴患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社丰富大队医疗站。

十

〔处方〕 雄 黄
烟 油
白 酒 各适量

〔制法〕 共调成膏状。

〔用途〕 用于带状疱疹。

〔用法〕 外敷患处。疼时换药。

〔临床疗效〕 经该站临床应用良好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社小偏岭大队医疗站。

外 伤 出 血

一

〔处方〕 幼 鼠 7个
生石灰 适量

〔制法〕 将未长毛的幼鼠加生石灰捣烂，制成薄饼晒干，研成细粉，过100目筛即得。

〔用途〕 用于外伤出血。

〔用法〕 外用，敷在出血的伤口处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县通远堡公社大黑山大队医疗站。

二

〔处方〕 核桃树根皮 适量

〔制法〕 将核桃树根皮烧成存性，制成炭，研成细粉即得。

〔用途〕 用于外伤止血。

〔用法〕 外用，敷于伤口处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟公社姜家堡子大队医疗站。

三

〔处方〕 地榆 适量

〔制法〕 将地榆烧成存性，制成炭（可直接用炮制好的地榆炭），研成细粉即成。

〔用途〕 用于外伤止血。

〔用法〕 外用，敷于伤口处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社后地大队医疗站。

四

〔处方〕 猪头骨

板栗锅（代刺的）等量

〔制法〕 先将猪头骨烧成存性，栗锅炒黄，共为细粉，过100目筛。

〔用途〕 用于外伤出血。

〔用法〕 外用，敷于患处。

〔临床应用〕 经该站临床应用，效

果良好。

〔处方来源〕 凤城县沙里寨公社亮子河医疗站。

五

〔处方〕 生南星 适量

〔制法〕 将生南星洗净，晒干，粉碎过100目筛即得。

〔用途〕 用于外伤止血。

〔用法〕 外用，将生南星适量的细粉敷在患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 宽甸县夹皮沟公社医院。

六

〔处方〕 白鲜皮 250克

海螵蛸 250克
煅龙骨 250克
冰片 25克

〔制法〕 先将海螵蛸（乌贼骨）用清水漂洗去腥臭味和硬盖，晒干，再将白鲜皮炒黄与海螵蛸、煅龙骨共为细粉，过100目筛即得。

〔用途〕 用于外伤止血。

〔用法〕 外用，将药粉敷于患处。

〔临床效果〕 经该院临床应用多年，效果良好。

〔处方来源〕 市郊区九连城地区医院。

癣 症

〔处方〕 黄柏子

海桐皮 等量
酒 适量

〔制法〕 将海桐皮切碎与蛇床子加酒适量，浸泡7天即得。

〔用途〕 用于牛皮癣。

〔用法〕 外用，用时先将患部去痂后，再用上述药酒涂擦患处即可。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 丹东市第二人民医院。

二

〔处方〕 五倍子 50克

米醋 200毫升

〔制法〕 将五倍子捣碎，用醋浸泡1昼夜，再用慢火煎沸，过滤去渣，备用。

〔用途〕 用于牛皮癣。

〔用法〕 外用，用上述药液涂于患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 宽甸县毛甸子公社地区医院。

三

〔处方〕 艾叶 适量

醋精 适量

〔制法〕 将艾叶装入瓶内，加入醋精浸泡10天左右即可。

〔用途〕 用于癣癩症。

〔用法〕 外用，用时将上述药液加1倍量凉开水稀释，涂擦患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 凤城县鸡冠山公社医院。

院。

四

〔处方〕 陈旧的葛条 适量

〔制法〕 将陈旧的葛条焙黄，研成细粉，加等量的牛油调成膏状即得。

〔用途〕 用于牛皮癣。

〔用法〕 外用，将药膏涂于患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社小偏岭大队医疗站。

五

〔处方〕 黑胡椒 7粒

紫皮独头蒜 2头

〔制法〕 先将紫皮独头蒜去皮，再与黑胡椒共捣成糊状即得。

〔用途〕 用于牛皮癣。

〔用法〕 外用，在外耳轮处用针尖划迹，将上述捣好的糊状药物，用纱布蘸取涂擦划迹处。4天涂擦一次。可两耳轮换划迹，如两耳正面划完可在耳轮背划迹，按4天为一次推之。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县草河公社秋岭大队医疗站。

六

〔处方〕 良姜 25克

官桂 25克

细辛 25克

斑蝥 (去翅) 5个

〔制法〕 将上述四味药，装入瓶内加白酒150毫升，浸泡3天。

〔用途〕 用于牛皮癣。

〔用法〕 外用，每日1~2次搽患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 东沟县新立公社医院。

七

〔处方〕	蝉 蜕	15克
	石 膏	15克
	木 通	15克
	独 活	15克
	羌 活	15克
	黑芝麻	15克
	熟 地	15克
	苦 参	15克
	荆 芥	15克
	大力子	15克

元 参 15克
甘 草 15克

〔制法〕 将上述12味药，加水共煮3次，过滤，合并滤液去渣。

〔用途〕 用于牛皮癣。

〔用法〕 内服，上述处方量为1付，1日量，分2次服。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县石庙子公社医院。

八

〔处方〕	鸡 油	适量
	枯 矾	适量

〔制法〕 将上述2味药，搅拌均匀成膏即得。

〔用途〕 用于头癣。

〔用法〕 外用，敷于患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 东沟县孤山公社医院。

九

〔处方〕 白芷 适量
猪板油 适量

〔制法〕 将白芷研成细粉，加猪油调成软膏状，备用。

〔用途〕 用于秃疮、疥疮、癣类（牛皮癣除外）。

〔用法〕 外用，每日1次，先洗患处后涂药膏（涂药膏时不可太厚，只有硬币厚即可，务必涂过患部边际）。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县新甸公社前堡医疗站。

十

〔处方〕 斑蝥 5个
生半夏 15克
酒精 适量

〔制法〕 将斑蝥、生半夏加75%酒精150毫升，浸泡1周。

〔用途〕 用于神经性皮炎。

〔用法〕 外用，反复多次涂擦患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 东沟县长安公社叶茂大队医疗站。

跌打损伤

一

〔处方〕 西瓜皮 25克
〔制法〕 干燥研面。
〔用途〕 用于闪腰叉气，闪挫伤。
〔用法〕 日服1次、每次25克，用

黄酒冲服。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县岭沟公社医院。

二

〔处方〕 鸡爪子 1对
黄瓜籽 适量
〔制法〕 各焙黄研面。

〔用途〕 用于骨折（粉碎性）。

〔用法〕 1付分3次服，每天服1次，空腹用黄酒冲服。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县石庙公社东堡大队医疗站。

〔注〕 临床反应服后有刺感。黄瓜籽用量比一对鸡爪子重量要多一点。

三

〔处方〕	血 竭	10克
	红 花	25克
	儿 茶	15克
	乳 香	15克
	没 药	15克
	土 虫	25克
	自然铜	20克

炙马前子 20克
〔制法〕 共为细末，炼蜜为丸，丸重10克。

〔用途〕 活血消瘀，消肿止痛，跌打损伤，骨折。

〔用法〕 每日2次，每次1丸，白开水送下。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

四

〔处方〕 炙鹿角 6000克
土 虫 4500克
桑 皮 4500克
酒 适 量
醋 适 量

〔制法〕 将上述3味药粉碎过100目

筛，每500克药面加入荞麦面1000克、酒、醋各6500克，调匀，加热搅拌，浓缩成糊状即可。

〔用途〕 用于散瘀活血，消肿止痛，各种骨折。

〔用法〕 外用，局部外敷。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市中医院。

五

〔处方〕 黄 柏
半 夏 各等量

〔制法〕 共为细面。

〔用途〕 用于跌打损伤。

〔用法〕 用醋或白酒调成糊状，敷于患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效

果较好。

〔处方来源〕 凤城县杨木公社建设医疗站。

六

〔处方〕 细 辛 7.5克
红 花 7.5克
梔 子 20克
土 虫 5 克
白 面 适量

〔制法〕 共为细末。

〔用途〕 用于各种跌打损伤。

〔用法〕 用水调成糊状敷患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 市郊区九连城公社庙岭医疗站。

〔注〕 没有梔子可用三七。

七

〔处方〕 羊蹄叶根 2200克
无 烟 煤 1900克
黄 柏 1750克

〔制法〕 以上3种药，粉碎过80目筛。

〔用途〕 用于跌打损伤。

〔用法〕 用白酒调成糊状敷于患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县通远堡公社大黑山大队医疗站。

八

〔处方〕 小杨树根
槐树根

柳树根

桃树根

梨树根

杏树根

桑树根

香菜籽

鸡蛋清 各等量

〔制法〕 去外皮，取内皮，加香菜籽捣粘，用鸡蛋清调成膏状。

〔用途〕 用于跌打损伤。

〔用法〕 外用，敷于患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县洋河公社马家堡大队医疗站。

九

〔处方〕 川龙骨 50克

〔制法〕 水煎2次，剩一中碗。

〔用途〕 一切扭伤。

〔用法〕 将煎出液1次服。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 市郊区浪头医院。

烧 烫 伤

—

〔处方〕 老松树皮 适量
冰 片 适量

〔制法〕 将老松树皮烧成炭（勿烧成白灰），粉碎过100目筛，加入冰片细粉混匀即得。

〔用途〕 用于烧、烫伤。

〔用法〕 外用，用药前先将水泡挑破，用香油将上述药粉调成糊状，敷于

患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 凤城县草河公社富家医疗站。

二

〔处方〕 猪蹄壳 适量
香油 适量

〔制法〕 用火焙黄至苏，制成面，用香油调成糊状。

〔用途〕 烧、烫伤。

〔用法〕 外用，敷患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

三

〔处方〕 猪毛 适量
香油 适量

〔制法〕 将猪毛烧成炭状，用香油搅拌成膏即可。

〔用途〕 烧伤。

〔用法〕 外用，将药膏敷于患处，每日1次。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果好。

〔处方来源〕 岫岩县洋河公社唐堡大队医疗站。

四

〔处方〕 獾子油 100克
冰片 适量

〔制法〕 先将獾子油烧开，凉后加

冰片调匀（冰片要研细面）。

〔用途〕 烧、烫伤。

〔用法〕 外用，敷患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社丰富大队医疗站。

五

〔处方〕 兔子毛 适量

〔制法〕 烧成炭状。

〔用途〕 外用，治疗烧伤。

〔用法〕 将上述炭状兔子毛撒于烧伤面。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县石庙公社医院。

六

〔处方〕 炒地榆
生黄柏 等量

〔制法〕 将上述2味药研成细面。

〔用途〕 烧、烫伤。

〔用法〕 外用，先将创伤面水泡刺破，将药面撒于伤面，包扎，每日换药2次。如伤面干燥无渗出液时，须将药面用香油或熟豆油调匀涂于局部。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 东沟县新农公社四家子大队合作医疗站。

七

〔处方〕 生地榆 1000克
黄 芩 250克

紫 草 500克

〔制法〕 将上述 3 味药共研细末，
用香油调匀。

〔用途〕 I°—II°的烧、烫伤。

〔用法〕 外用，敷患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效
果良好。

〔处方来源〕 岫岩县黄花甸公社老
窝大队医疗站。

八

〔处方〕 生地榆

生大黄 等量

〔制法〕 将上述 2 味药研成细面，
用香油或豆油调匀即可。

〔用途〕 烧、烫伤。

〔用法〕 外用，敷患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效

果很好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社医
院。

九

〔处方〕 生石灰 适量

香 油 适量

〔制法〕 将生石灰浸泡在常水中，
搅拌后静置沉淀，去掉液面上的硬膜。取
上清液和香油调成流浸膏状即得。

〔用途〕 烫伤。

〔用法〕 外用，涂于患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效
果较好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

十

〔处方〕 五倍子 15克

冰 片 5 克

〔制法〕 将上述 2 味药共研细末。

〔用途〕 烧、烫伤。

〔用法〕 外用，水调，外敷患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 市郊区九连城公社庙岭大队医疗站。

〔注〕 如果有感染者可加青黛 2.5 克。

十一

〔处方〕 生 地 100 克

冰 片 15 克

青 黛 15 克

香 油 500 毫升

蜂 蜡 适量

〔制法〕 先将生地用香油炸枯后捞

出、放入蜂蜡熔化过滤，待凉后，再加入冰片、青黛，搅匀成膏即可。

〔用途〕 烧、烫伤。

〔用法〕 外用，局部外敷。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市中医院。

十二

〔处方〕 生石羔 50 克

生川军 50 克

生地榆 15 克

香 油 适量

〔制法〕 将上述 3 味药研成细末，用香油调成糊状，即可备用。

〔用途〕 烧、烫伤。

〔用法〕 外用，将药膏涂患处，每日 2 ~ 3 次

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 东沟县长山公社医院。

治 蛇 咬 伤

一

〔处方〕 雄 黄 25克
五灵脂 50克
白 芷 25克

〔制法〕 将上述 3 味药，共为细粉。

〔用途〕 用于蛇咬伤。

〔用法〕 每日服 3 次，每次服 5 克。

〔临床效果〕 经临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 丹东市医药公司。

二

〔处方〕 面 碱 适量

〔制法〕 用适量温水将面碱溶解。

〔用途〕 用于蛇咬伤。

〔用法〕 用碱水擦洗患部。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

三

〔处方〕 活蜘蛛 数个

〔用途〕 用于蛇咬伤。

〔用法〕 用活蜘蛛 2 ~ 3 个放在患处，让蜘蛛吸毒素。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，疗效明显。

〔处方来源〕 丹东市滨江卫生院。

四

〔处方〕 线 麻

〔制法〕 将鲜麻茎、叶捣乱。

〔用途〕 用于蛇咬伤。

〔用法〕 敷于患处。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，有效。

〔处方来源〕 市郊区楼房卫生院。

五

〔处方〕 眉豆叶 适量

〔制法〕 将鲜眉豆叶捣成糊状。

〔用途〕 用于蛇咬伤。

〔用法〕 敷于患处。

〔临床疗效〕 经该站临床观察，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县洋河公社贾家

经大队合作医疗站。

六

〔处方〕 黄豆叶 适量（幼苗更好）

白 糖 适量

〔制法〕 将上述2味药捣成糊状。

〔用途〕 蛇咬伤。

〔用法〕 敷于患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，疗效很好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社五间房大队医疗站。

七

〔处方〕 韭 菜 500克

白 糖 适量

〔制法〕 将韭菜用适量白糖捣成糊

状即可。

〔用途〕 蛇咬伤

〔用法〕 敷于患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社丰富大队合作医疗站。

八

〔处方〕 走马芹 适量
朱砂 2.5克
鸡蛋清 1个

〔制法〕 ①将走马芹捣乱。
②把鸡蛋清、朱砂混合在一起搅匀。

〔用途〕 用于蛇咬伤。

〔用法〕 先将走马芹敷患处2小时取下，再将鸡蛋清、朱砂混悬液敷在蛇咬

伤口，半小时取下，如此反复交替使用，直到消肿为止。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 宽甸县夹皮沟公社小汤石大队医疗站。

九

〔处方〕 鲜蚯蚓 数条
白糖 适量

〔制法〕 将蚯蚓放白糖中溶化。

〔用途〕 用于蛇咬伤。

〔用法〕 敷患处。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，有效。

〔处方来源〕 凤城县草河公社卫生院。

皮 肤 科

一

〔处方〕 樟 丹 10克
枯 矾 15克
五倍子 10克

〔制法〕 将上述 3 味药共为细末。

〔用途〕 黄水疮、湿疹。

〔用法〕 患处有渗出液者干敷，无渗出液者，用香油调敷。

〔临床疗效〕 效果良好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

二

〔处方〕 石 花
冰 片

〔制法〕 将上述 2 药等量 共 为 细

末。

〔用途〕 治疗湿疹。

〔用法〕 外敷，若无渗出液可用香油调敷。

〔临床疗效〕 临床应用，疗效良好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

三

〔处方〕 硫 黄 适量
姜 片 适量
白 酒 适量

〔制法〕 将硫黄研面，将白酒微温，用新鲜姜片蘸酒和硫黄往疮上抹擦。

〔用途〕 黄水疮。

〔用法〕 每日 1 ~ 2 次。

〔临床疗效〕 效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县石庙公社东堡大队医疗站。

四

〔处方〕 黄 柏 100克
枣 炭 50克

〔制法〕 大枣去核用铁片焙成焦黑为度，同黄柏共为细末。

〔用途〕 用于黄水疮。

〔用法〕 患处流黄水者，干敷，无黄水，用香油调敷。

〔临床疗效〕 效果良好。

〔处方来源〕 凤城县中医院。

五

〔处方〕 荞麦杆

〔制法〕 将荞麦杆烧成灰，加水过滤后用其水洗患处。

〔用途〕 治疗湿疹。

〔用法〕 见制法。

〔临床疗效〕 效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县新甸公社医院。

六

〔处方〕 熟鸡蛋黄 1个

〔制法〕 将熟鸡蛋黄放在小勺内，用文火烤出油。

〔用途〕 治疗婴儿湿疹、胎毒。

〔用法〕 将烤出的鸡蛋黄油涂擦患处。

〔临床疗效〕 效果良好。

〔处方来源〕 市郊区同兴卫生院。

七

〔处方〕 儿 茶 300克

枯 矾 300克

冰 片 50克

〔制法〕 共为细末。

〔用途〕 用于下肢溃疡。

〔用法〕 外用，敷于患处。

〔临床疗效〕 经该医疗站应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县洋河公社瓦房店合作医疗站。

八

〔处方〕 雄 黄
明 矾 等量

〔制法〕 用凡士林调成软膏。

〔用途〕 用于下肢溃疡。

〔用法〕 外用，取适量涂于患处。

〔临床疗效〕 经该医疗站应用，10余例效果较好。

〔处方来源〕 凤城县杨木公社建设大队医疗站。

九

〔处方〕 油松树毛 适量

〔制法〕 水煎煮沸约半小时，备用。

〔用途〕 用于风疹。

〔用法〕 趁热洗凉为止。

〔临床疗效〕 较好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社五间房大队医疗站。

十

〔处方〕 松 香
枯 矾
樟 丹 各等量

〔制法〕 将上述3味药共为细末，加少量冰片用油调成膏状。

〔用途〕 治疗黄水疮。

〔用法〕 敷于患处。

〔临床疗效〕 效果良好。
 〔处方来源〕 凤城县汤山城公社医

院。

十一

〔处方〕 威灵仙根 适量
 〔制法〕 水煎。
 〔用途〕 用于阴囊湿疹。
 〔用法〕 用水煎液洗患处，1 日数

次。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县哨子河公社医院。

十二

〔处方〕 寒水石 25克
 香油 适量

〔制法〕 寒水石研面，用香油调。
 〔用途〕 阴囊湿疹、婴儿湿疹。
 〔用法〕 敷于患处。

〔临床疗效〕 经该站治疗，效果很好。

〔处方来源〕 市郊区浪头公社瓦房医疗站。

十三

〔处方〕 炉甘石 25克
 花椒面 15克
 铜 绿 10克
 川 占 15克
 龙 骨 15克
 冰 片 1.0克
 猪 油 适量

〔制法〕 将上述 6 味药研细，先将新鲜猪油适量放于砂锅内化开，再将研细

药粉放入，至川占（或蜂腊）溶化为止，调匀，待其温度降到不烫人时涂于患处。

〔用途〕 用于下肢溃疡。

〔用法〕 外用，睡前涂于患处，次日晨去掉。

〔临床疗效〕 效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县哨子河公社虎岭大队医疗站。

〔注〕 如无川占，可用蜂腊代替。

十四

〔处方〕 青 黛 10克

石 炭 20克

滑石粉 20克

黄 柏 10克

〔制法〕 将上述4味药共为细粉，用香油调成糊状。

〔用途〕 治疗黄水疮。

〔用法〕 敷于患处。

〔临床疗效〕 效果良好。

〔处方来源〕 市郊区五龙背孙家医疗站。

十五

〔处方〕 轻 粉 7.5克

黄 柏 15克

川 椒 15克

雄 黄 15克

枯 矾 15克

（或外加松香、樟丹等量，有川椒疗效好）

〔制法〕 将上述5味药用食醋浸泡10~20分钟后，煎煮至沸腾。

〔用途〕 用于治疗风疹。

〔用法〕 用药棉涂擦患处。

〔临床疗效〕 效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社五间房大队医疗站。

十六

〔处方〕 苦 参
白 矾

白鲜皮 各等量

〔制法〕 先将苦参、白鲜皮加水适量，煮沸，然后放入白矾即得。

〔用途〕 外用，用上述煎好的药液洗患处。

〔临床疗效〕 效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社郭家堡大队医疗站。

十七

〔处方〕 猪苦胆 1个
黄 豆 适量

〔制法〕 取黄豆适量，放入新鲜的猪苦胆内，使黄豆浸透，吸尽胆汁，取出黄豆，放在瓦片上焙焦研成细粉，调香油外敷。

〔用途〕 用于下肢溃疡。

〔用法〕 外用，敷于患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 凤城县杨木公社医院。

十八

〔处方〕 山羊胡子 适量

〔制法〕 将山羊胡子烧成炭，研成细粉，加豆油适量（或香油）调成糊状即得。

〔用途〕 用于黄水疮。

〔用法〕 外用，涂于患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社丰源大队医疗站。

十九

〔处方〕 稻 糠 500克

〔制法〕 取一空碗，用毛头纸将碗口封好（用纸绳十字花型缚好），然后将稻糠放在纸上，放成圆锥形，用炭火点燃稻糠，见纸绳烧断时，即可将纸和糠炭一并除掉，糠油即在碗内，装瓶备用。

〔用途〕 用于风疹。

〔用法〕 外用，将糠油涂于患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县洋河公社唐堡大队医疗站。

冻 伤

一

〔处方〕 山 楂 适量

〔制法〕 将山楂烧至八分熟，除核，捣烂。

〔用途〕 用于冻伤（未溃者）。

〔用法〕 外用，敷患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县大营子公社医院。

二

〔处方〕 赤 芍 50克

凡士林 50克

〔制法〕 将赤芍研细粉，用凡士林

调膏。

〔用途〕 用于冻伤。

〔用法〕 取上述药膏适量，涂于患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县岭沟公社山城大队医疗站。

乳 腺 炎 类

一

〔处方〕 猪苦胆 1 个

白 矾 5 克

〔制法〕 将白矾装入胆内放房檐下阴干，研成细粉备用。

〔用途〕 乳腺炎已溃烂，破裂者。

〔用法〕 用香油调成糊状外敷患

处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县大营公社大营子大队合作医疗站。

二

〔处方〕 家核桃 1 个

蜈 蚣 1 个

全 虫 1 个

〔制法〕 将核桃仁取出和蜈蚣全虫放在核桃壳内，用黄泥包裹烧成存性，研成细粉。

〔用途〕 乳腺炎初期。

〔用法〕 将研成的细粉，分 2 次早晚用黄酒冲服，发汗。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县沙里寨公社医院。

三

〔处方〕 鸡 蛋 1 个
喜 蛛 7 个
葱 须 适量
鹿 角 2.5 克

〔制法〕 将鸡蛋打一个小孔，把喜蛛、葱须、鹿角面装入蛋内，用湿纸包好，放炭火中烧熟。

〔用途〕 急性乳腺炎。

〔用法〕 将熟鸡蛋 1 次内服。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果显著。

〔处方来源〕 丹东市郊区医院。

四

〔处方〕 蒲公英 1000 克
黄 柏 500 克

〔制法〕 将 2 味药研成细粉装入胶囊。

〔用途〕 乳腺炎、腮腺炎、上感。

〔用法〕 口服 1 日 3 次，每次 2 ~ 4 粒。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 凤城县草河公社医院。

五

〔处方〕 漏 芦 15 克
甲 珠 5 克

〔制法〕 将上述 2 味药加适量水煎

煮2次，合并滤液。

〔用途〕 用于乳腺炎初期。

〔用法〕 内服，将煎出药液1次服完，微发汗。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 东沟县新沟公社宣城医疗站。

六

〔处方〕 半 夏

葱 白 各等份

〔制法〕 将2味药烘干研成细粉。

〔用途〕 急性乳腺炎早期。

〔用法〕 晚睡时将药物敷于鼻孔处，次日取下。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 凤城县通远堡公社张家大队医疗站。

七

〔处方〕 仙人掌 适量

白 矾 适量

〔制法〕 将2味药合在一起捣烂。

〔用途〕 乳腺炎初期。

〔用法〕 将捣烂的药物敷在患处，用完洗净。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市郊区浪头医院。

八

〔处方〕 白头翁根 适量

〔制法〕 将白头翁根洗净晾干，煨

黄研成细粉。

〔用途〕 初期乳腺炎。

〔用法〕 每日2次，每次5克，用黄酒冲开服下。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县大营公社大营子大队合作医疗站。

九

〔处方〕	蒲公英	100克
	鲜蒲公英	适量
	白矾	适量

〔制法〕 先将蒲公英用水煎煮2次，做内服用。再将鲜蒲公英和白矾一起捣烂做外敷用。

〔用途〕 乳腺炎。

〔用法〕 将水煎液早晚分2次内

服。把捣烂的蒲公英敷于患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟医院。

十

〔处方〕 山豆根
烟袋油 各适量

〔制法〕 将山豆根研成细粉，再用烟袋油调成糊状。

〔用途〕 乳腺炎初期，未溃者。

〔用法〕 将调成糊状膏敷于患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社木岭大队合作医疗站。

十一

〔处方〕 鳖 甲 适量

〔制法〕 将鳖甲研成细粉，用香油调成糊状。

〔用途〕 乳头裂。

〔用法〕 涂于患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 丹东市第一医院。

十二

〔处方〕 公丁香 50克

冰 片 1.5克

〔制法〕 将公丁香、冰片研成细粉备用。

〔用途〕 乳头裂。

〔用法〕 用细粉敷于患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

十三

〔处方〕 生石膏

豆 油 各适量

〔制法〕 将生石膏研成细粉，用豆油调成稠状外敷。

〔用途〕 乳头裂。

〔用法〕 将调成的油状膏敷于乳头上。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县大营公社大营子大队合作医疗站。

十四

〔处方〕 桦树皮 50克
鸡蛋 3个

〔制法〕 将桦树皮煎煮半小时，过滤，再将鸡蛋打入煮熟。

〔用途〕 用于乳腺炎初期。

〔用法〕 内服，将药液和鸡蛋1次服，发汗。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 东沟县新沟公社医院。

十五

〔处方〕 地瓜 250克
白矾 50克

〔制法〕 将上述2味药捣成糊状即

可。

〔用途〕 用于乳腺炎。

〔用法〕 外用，敷在乳头周围。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县汤沟公社东兴大队医疗站。

十六

〔处方〕 茵陈蒿 25克
川朴 15克
丹参 50克
鳖甲 40克
郁金 15克
丹皮 15克
双花 50克
半支莲 50克
苡米 50克

青 皮 50克
 红 花 15克
 金钱草 50克
 三 七 15克
 白 术 50克

〔制法〕 将上述药用水煎煮。

〔用途〕 胰腺癌。

〔用法〕 每日 1 剂，早晚 2 次，口服。

〔临床疗效〕 经应院临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县岭沟公社医院。

脚 气

一

〔处方〕 黄 柏 1500克

明 矾 750克

滑石粉 1500克

〔制法〕 将上述 3 味药共为细末。

〔用途〕 用于脚气。

〔用法〕 外用，晚间洗脚后，敷患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县沙里寨公社医院。

二

〔处方〕 羊蹄叶根 适量

〔制法〕 将上述药用米醋泡。

〔用途〕 用于脚气。

〔用法〕 外用，涂患处，每日 3 次。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效

果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

三

〔处方〕 生石灰 适量

冰 片 适量

〔制法〕 将生石灰加适量水溶解，取上清液再加入冰片。

〔用途〕 用于脚气。

〔用法〕 外用，涂患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 凤城县草河公社医院。

四

〔处方〕 透骨草 适量

〔制法〕 将药水煎。

〔用途〕 用于手气、脚气。

〔用法〕 外用，用上述水煎液外洗。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社医院。

〔注〕 该方有时可加防风、荆芥。

五

〔处方〕 海 水 适量

〔用途〕 用于脚气。

〔用法〕 外用，用海水洗脚。

〔临床疗效〕 经该所观察，效果很好。

〔处方来源〕 东沟县药品检验所。

〔注〕 无海水，可用咸水。

治疗脚鸡眼方

—

〔处方〕 黄豆芽 250克

〔制法〕 将黄豆芽用清水煮熟，只用油、盐调味，就饭服下。

〔用途〕 用于治疗脚鸡眼。

〔用法〕 每日早、晚2次，连服5天。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县石庙子公社地区医院。

脉管炎

〔处方〕 花椒 适量

陈大酱 适量

白面 适量

〔制法〕 将花椒研细放入大酱中，用白面调糊状。

〔用途〕 脉管炎。

〔用法〕 外敷患部，干后再换。

〔临床疗效〕 经该医院临床应用，疗效良好。

〔处方来源〕 岫岩县石庙公社医院。

肠梗阻

〔处方〕 巴豆壳 适量

〔制法〕 将巴豆壳卷成烟卷。

〔用途〕 肠梗阻。

〔用法〕 当烟吸入。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，疗效良好。

〔处方来源〕 东沟县孤山公社医院。

痔 疮

一

〔处方〕 蓖麻子叶 适量

〔用法〕 用其叶约 1 寸厚，让患者坐在叶子上，对着肛门，把炕烧热，用被围好，至患者出汗为止（大约 1 个小时）。再换一次。

〔用途〕 用于治疗痔疮。

〔临床疗效〕 经该站临床观察，效

果良好。

〔处方来源〕 三道湾大队医疗站。

二

〔处方〕 芒硝 100克

〔制法〕 将芒硝用热水溶化。

〔用途〕 用于治疗痔疮。

〔用法〕 趁热坐浴。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县汤山城公社医院。

三

〔处方〕 河豚鱼肝油

〔用途〕 痔疮。

〔用法〕 用河豚鱼肝油擦患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效

果很好。

〔处方来源〕 丹东市中医院。

四

〔处方〕 蛇 胆 适量

〔制法〕 取新鲜蛇胆，剪开胆管，
取汁。

〔用途〕 用于外痔。

〔用法〕 外用，将胆汁涂于患处，
每日 2 次，早晚涂之。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效
果很好。

〔处方来源〕 东沟县北井子公社地
区医院。

五官科

中 耳 炎

—

〔处方〕 香菜籽 适量
明 矾 适量

〔制法〕 将上述 2 味药，分别烧
焦，研成细末，用 1% 呋喃西林软膏调匀
即得。

〔用途〕 用于中耳炎。

〔用法〕 取上述药膏少许涂于耳
内。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效
果很好。

〔处方来源〕 岫岩县石庙子公社丁

子峪医疗站。

二

〔处方〕 山核桃仁 适量

〔制法〕 将核桃仁用文火焙成黄色，用纱布包挤出油。

〔用途〕 用于中耳炎。

〔用法〕 先将耳内擦净，滴入耳内。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社丰源大队合作医疗站。

三

〔处方〕 猪苦胆 1个

桑枝 适量

枯矾 15克

〔制法〕 先将桑枝切碎炒成炭，与枯矾共研成细粉，加入胆汁搅匀，干燥研成细粉混匀即得。

〔用途〕 用于中耳炎。

〔用法〕 取上述药粉少许，装入细纸筒中，吹入耳内。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社医院。

四

〔处方〕 冰片 0.5克

猪苦胆 1个

〔制法〕 把猪苦胆焙干同冰片研成面。

〔用途〕 用于中耳炎。

〔用法〕 先用3%双氧水将耳内脓

水洗净，将药面放入纸筒吹入耳内。

〔临床疗效〕 经该站临床观察，效果很好。

〔处方来源〕 东沟县新沟公社宣城大队医疗站。

〔注〕 鸡胆汁与上方有同样效果，将鸡胆汁滴入耳内。

五

〔处方〕 黄 柏 5 克
黄 连 2.5 克
大 黄 5 克

〔制法〕 上方用酒精20毫升浸泡3天即可。

〔用途〕 用于中耳炎。

〔制法〕 滴入耳内。

〔临床疗效〕 经该站临床观察，效果很好。

〔处方来源〕 东沟县马家岗公社夏家大队医疗站。

六

〔处方〕 鳖 甲 适量

〔制法〕 慢火焙干研细粉。

〔用途〕 用于中耳炎。

〔用法〕 用3%双氧水冲洗内耳道，然后将细粉装纸筒中，吹入耳内。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县大营公社王堡大队医疗站。

鼻 炎

〔处方〕 苍耳子 20 克
白 糖 50 克

〔制法〕 将上述 2 味药混在一起水煎。

〔用途〕 用于鼻炎。

〔用法〕 内服，日服 2 次，每日 1 剂。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县洋河公社唐家堡医疗站。

口 腔 溃 疡

〔处方〕 枯 矾

青 黛

黄柏粉 各等量

〔制法〕 将上述 3 味药共为细粉即可。

〔用途〕 用于口腔溃疡。

〔用法〕 吹入口内。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社小偏岭医疗站。

扁 桃 腺 炎

〔处方〕 黄 柏

苦 参

狗奶根 各等量

〔制法〕 将上述 3 味药共研细粉，制成水丸。

〔用途〕 用于扁桃腺炎、上呼吸道感染。

〔用法〕 日服 3 次，每次 5 克。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效

果很好。

〔处方来源〕 凤城县沙里寨公社李家大队医疗站。

二

〔处方〕 山豆根 100克
野薄荷 50克
射干 100克

〔制法〕 将上述 3 味药共为细粉，水泛小丸。

〔用途〕 用于咽喉肿痛，慢性扁桃腺炎。

〔用法〕 日服 3 次，每次 5 克。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 凤城县沙里寨公社蔡家医疗站。

〔注〕 服药期间禁忌：辛、辣、刺

激性食物。

三

〔处方〕 射干 15克
地丁 15克
薄荷 10克

〔制法〕 将上述 3 味药水煎。

〔用途〕 用于扁桃腺炎。

〔用法〕 日服 2 次，每日 1 剂。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 东沟县新沟公社医院。

四

〔处方〕 黄芩 5000克
黄柏 5000克
苦参 25000克

〔制法〕 先将黄芩、黄柏共为细粉，苦参水煎浓缩成膏与细粉混匀，炼蜜为丸。丸重7.5克。

〔用途〕 用于咽炎，扁桃腺炎。

〔用法〕 日服2次，每次1丸。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟公社医院。

五

〔处方〕 大 黄 250克

狗奶根 250克

黄 柏 500克

〔制法〕 将上述3味药共研细粉，过100目筛，药渣煎汁泛丸，青黛挂衣。

〔用途〕 用于呼吸道感染，扁桃腺炎，气管炎，胆囊炎，阑尾炎，肠炎。

〔用法〕 日服3次，每次5克。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 市郊区同兴公社医院。

六

〔处方〕 山豆根 500克

桔 梗 750克

草河车 750克

〔制法〕 取山豆根切成碎块，加5倍量水，用盐酸调PH至1~2，浸渍6小时以上。过滤，滤渣再加3倍量水调PH 3~4，浸渍3小时（同样操作进行2~3次），过滤，合并滤液，浓缩至1/4量。滤液用40%氢氧化钠调PH至9~10，滤取沉淀。沉淀加4倍量乙醇，加热回流提取，醇提取液回收乙醇，加适量蒸

7 8 9 20 1 2

馏水，用稀盐酸调节PH至3，过滤，滤液再用氢氧化铵调PH至8~10，放置使充分沉淀，过滤，收集淡黄色沉淀。再取桔梗、草河车加水煎煮3次，每次30分钟，过滤，合并3次滤液，浓缩成稠膏状。将沉淀物和稠膏干燥，粉碎，混匀，制成颗粒，打片即得。片重0.3克。

〔用途〕 用于喉炎，支气管炎，上呼吸道感染。

〔用法〕 口服2次，每次3~5片。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市中医院。

七

〔处方〕	蒲公英	25克
	连翘	20克
	知母	15克

大力子	20克
山豆根	10克
射干	10克

〔制法〕 先将大力子、连翘共为细粉，备用。再将蒲公英、知母、山豆根、射干加水煎煮2次，每次半小时，过滤，合并2次滤液，浓缩成稠膏状，与备用粉混匀，制成软材，搓过16~22目筛，制成颗粒，干燥即得。

〔用途〕 咽炎，扁桃腺炎。

〔用法〕 用白开水冲服，口服2次，每次2.5~5.0克。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

八

〔处方〕	山豆根	3000克
------	-----	-------

野菊花	1500克
葛 根	1500克
蒲公英	1500克
狗奶根	1500克
冰 片	100克

〔制法〕 将山豆根、野菊花、蒲公英、狗奶根粉碎过 100 目筛，粗渣与葛根加水煎煮 2 次，每次 1 小时，过滤，合并 2 次滤液浓缩成膏与药粉混匀，干燥，粉碎过 100 目筛加入冰片，以水泛丸，雄黄为衣，打光，干燥。

〔用途〕 用于咽喉肿痛。

〔用法〕 日服 3 次，每次 5 克。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县沙里寨公社亮子河医疗站。

九

〔处方〕 活蜘蛛 适量
白 矾 适量

〔制法〕 先将白矾放入勺内化开后，放入蜘蛛。待蜘蛛和白矾枯焦为止，研成细粉备用。

〔用途〕 用于扁桃腺炎。

〔用法〕 取上述药粉少许，吹患处。每日 2～3 次。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 东沟县马家岗公社马家岗大队医疗站。

结 膜 炎

〔处方〕 黄 柏 2 克
明 矾 1 克

〔制法〕 将上述 2 药共为细末。

〔用途〕 用于治疗结膜炎。

〔用法〕 凉开水调敷。

〔临床疗效〕 临床应用10几例，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社丰源大队医疗站。

眼 珠 扎 刺

〔处方〕 节菖蒲 2.5克

〔制法〕 研为细末，用温开水调匀做成枣核样。

〔用途〕 眼珠扎刺。

〔用法〕 左眼扎刺塞入右鼻孔内；右眼扎刺塞入左鼻孔内，出汗刺自出。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 东沟县十字街公社安全大队医疗站。

内科疾病

慢性气管炎

一

〔处方〕 麻 黄 15克
川 占 2.5克
白 矾 5 克

〔制法〕 将上药共研细粉。

〔用途〕 用于慢性气管炎。

〔用法〕 内服，每次服 2.5 克，每日 2 次。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

二

〔处方〕 满山红叶 50克
蒲 公 英 20克
地 丁 10克
桔 梗 20克
杏 仁 15克
五 味 子 15克

〔制法〕 水煎。

〔用途〕 用于慢性气管炎。

〔用法〕 内服，每日 1 剂，早、晚分服。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县岭沟公社医院。

三

〔处方〕 达子香 20克
桔 梗 15克
甘 草 10克

〔制法〕 共研细粉，过100目筛，
炼蜜为丸，制成每丸重5克即得。

〔用途〕 用于老年慢性气管炎。

〔用法〕 内服，每日2次，每次1
丸。

〔临床疗效〕 经该医疗站临床应
用，效果较好。

〔处方来源〕 凤城县沙里寨公社诗
雅甸大队医疗站。

〔注〕 服药后，有的可产生恶心、
头昏。

四

〔处方〕 满山红叶 2000克
福寿草 200克
麻黄素 20片

〔制法〕 将上药共研细粉，以水泛
丸，滑石为衣。

〔用途〕 用于老年慢性气管炎。

〔用法〕 内服，每次5克，开水送
服，每日2次。

〔临床疗效〕 经该医疗站临床应
用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县洋河公社唐堡
大队医疗站。

〔注〕 此方对肺心病效果好些，但
不宜过量。

五

〔处方〕 香 油 100克
蜂 蜜 100克
豆 腐 100克
鸡 蛋 2个

〔制法〕 将上述四味药放在一起搅拌均匀，用锅蒸熟即得。

〔用途〕 用于慢性气管炎。

〔用法〕 内服，1次顿服。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 岫岩县岭沟公社山城大队医疗站。

六

〔处方〕 猪 胆 1个
白 酒 50毫升

白 糖 50克
鸡 蛋 1个

〔制法〕 先将猪胆与白酒混匀后，以锅煎沸，再将白糖、鸡蛋加入锅内煎熟。

〔用途〕 用于慢性气管炎。

〔用法〕 内服，1日量，分2次服。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 凤城县通远堡医院。

〔注〕 服此药后，可能产生腹泻。

七

〔处方〕 鲜羊蹄叶根 15克
鸭 蛋 4个

〔制法〕 先将羊蹄叶根煮烂，再打进4个鸭蛋，制成荷包蛋即得。

〔用途〕 用于慢性气管炎。

〔用法〕 内服，吃蛋喝汤，分2次服。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 岫岩县岭沟公社山城大队医疗站。

八

〔处方〕 雄性癞蛤蟆 1个

鸡 蛋 1个

〔制法〕 将癞蛤蟆去五脏，装入鸡蛋，然后用黄泥包上，以火烘熟即得。

〔用途〕 内服，用于老年慢性气管炎。

〔用法〕 只吃鸡蛋，1次1个。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 岫岩县石庙公社东堡大队合作医疗站。

九

〔处方〕 满山红叶
暴马子皮

〔制法〕 取上药等量，洗净、干燥、粉碎。加水浸泡1小时，按蒸馏法提取，制成每毫升相当原生药1克，过滤、分装灭菌即得。

〔用途〕 用于老年慢性气管炎。

〔用法〕 肌肉注射，每日2次，每次4毫升。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社后地大队医疗站。

〔注〕 注射后局部有胀痛感，在短

时间内即可消失。

十

〔处方〕 蒲公英 1000克

〔制法〕 取上药洗净，干燥切碎，加水煎煮2次，每次煮沸30分钟，第一次加水3000毫升，第二次加水2000毫升。过滤去渣，合并2次滤液，浓缩至300~500毫升。加3倍量95%乙醇振摇，放置24小时，过滤，滤液回收乙醇，按此法反复几次至无沉淀生成即可。回收乙醇，加注射用水至200毫升，加热至沸，冷藏24小时，过滤，滤液加0.5~1%的活性炭煮沸15分钟，过滤，滤液保持80℃时用10%氢氧化钠调PH至7.0，过滤、分装、100℃30分灭菌即得。

〔用途〕 用于上呼吸道感染、支气管炎、扁桃体炎等。

〔用法〕 肌肉注射，每次2毫升，每日2~3次。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

十一

〔处方〕 去皮大蒜 4000克
苯甲醇 适量
吐温—80 适量

〔制法〕 将去皮的大蒜捣碎，立即加水蒸溜，收集粗溜液6000~8000毫升，再将粗溜液蒸溜，收集精溜液3000毫升左右，加入苯甲醇，吐温—80，混匀，加注射用水至4000毫升，过滤至澄明，灌封，灭菌，检查，印字即得。

〔用途〕 用于流感所引起的并发感染、支气管炎、肺炎等。

〔用法〕 肌肉注射，每次 2 毫升，每日 2 ~ 3 次。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

支 气 管 哮 喘

〔处方〕 鲜石苇 50克（干品15克）

冰 糖 150克

〔制法〕 先将石苇放入砂锅，加水 1500 毫升，煎取 750毫升，加入冰糖溶化后，即可服用。

〔用途〕 用于支气管哮喘。

〔用法〕 内服，1 日 3 次，每次 10 毫升，连服 7 天。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效

果较好。

〔处方来源〕 宽甸县夹皮沟公社夹皮沟医疗站。

咳 嗽

—

〔处方〕 暴马子 500克
野菊花 150克
满山红 200克
桑 皮 150克
五味子 150克
杏 仁 100克
生石羔 250克
紫 苑 250克
生麻黄 150克
甘 草 100克

〔制法〕 将以上10味药，共研细

粉，过100目筛，炼蜜为丸。每丸重10克。

〔用途〕 用于风寒咳嗽，伤风久咳，慢性气管炎。

〔用法〕 内服，每服1丸，日服2次。

〔临床疗效〕 经该站临床应用多例效果很好。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟榆树大队合作医疗站。

二

〔处方〕 牛 胆 1个

黑 豆 500粒

陈 皮 100克

〔制法〕 将陈皮研末，与黑豆共放入牛胆内拌匀，在通风处阴干即得。

〔用途〕 用于咳嗽、喘。

〔用法〕 内服，每日早、晚各服7

粒黑豆。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 宽甸县毛甸子公社医院。

〔注〕 猪胆亦可。

三

〔处方〕 柴 胡 10克

红 花 10克

艾 叶 10克

公 英 10克

〔制法〕 水煎。

〔用途〕 用于干咳无痰。

〔用法〕 内服，每日1剂，早晚分服。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 岫岩县岭沟公社三河大队医疗站。

肺 内 感 染

一

〔处方〕 鲜山芝麻根 5 克
鹅 蛋 1 个

〔制法〕 将山芝麻根洗净，切碎，加水煎煮 2 次，每次煮沸 1 小时，过滤，合并 2 次滤液，浓缩成稀糊状，打入鹅蛋煎熟。

〔用途〕 用于各种咳嗽。

〔用法〕 内服，每日 1 次，7 天为一疗程

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 凤城县红旗公社沈甸

医疗站。

二

〔处方〕 大 蒜 200 克
芒 硝 200 克
大 黄 200 克
食 醋 适量

〔制法〕 先将大蒜捣碎，加入芒硝，共捣成糊状即得，备用。再将大黄粉碎成细粉，加醋适量调成糊状，备用。

〔用途〕 用于大叶性肺炎。

〔用法〕 先将制好的大蒜、芒硝糊状药物，按投影病变部位的大小，涂在纱布块（1～2 层均可）上，敷在投影病变部位，待患儿感到有强烈刺激时取下。然后再将用醋调好的大黄末再敷于上述病变部位。以上为 1 日 1 次外敷。次日仍按此法操作，至愈为止。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

〔注〕 大蒜、芒硝糊状药物，外敷时间过长，有刺激皮肤起泡或破溃现象。

三

〔处方〕	白 果	15克
	地骨皮	15克
	广 皮	15克
	青 黛	5 克
	勾 藤	15克
	车前草	15克
	车前子	15克

〔制法〕 将上述 7 味药共为细粉，炼蜜为丸，每丸重 5 克。

〔用途〕 用于肺气肿、肺内感染。

〔用法〕 内服，每日 3 次，每次 2

丸，小儿每次 1 丸。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县草河公社医院。

四

〔处方〕	梔 子	10个
	杏 仁	10个
	桃 仁	10个
	蓖麻仁	10个

〔用法〕 将上药捣烂加荞面（白面亦可），与鸡蛋清搅为糊状，备用。

〔用途〕 外用，用于麻疹合并肺炎。

〔用法〕 将上药摊于白布上，敷于胸部，时常用温水湿润之，6 小时后取下。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 东沟县十字街公社棋盘大队医疗站。

〔注〕 此方定喘效果较好。

五

〔处方〕 金银花 100克
连翘 50克
牛蒡子 15克
小蓟 50克
天花粉 20克
麦冬 10克

〔制法〕 水煎。

〔用途〕 用于大叶性肺炎。

〔用法〕 内服，每日1剂，早、晚分2次服。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效

果较好。

〔处方来源〕 岫岩县岭沟公社医院。

〔注〕 病重可加瓜蒌100克。

六

〔处方〕 贝母 50克
双皮 50克
冬花 75克
麻黄 25克
杏仁 50克
苏子 50克
白果仁 150克
五味子 20克
甘草 40克

〔制法〕 将上药粉碎，过100目筛，混匀即得。

〔用途〕 用于清肺定喘、止咳祛

痰、感冒、咳嗽、支气管炎等症。

〔用法〕 内服，每日 3 次，每次 2.5~5.0克。

〔临床疗效〕 经该院门诊应用，效果良好。

〔处方来源〕 丹东市中医院。

七

〔处方〕	新鲜猪胆汁	15毫升
	苯 甲 醇	2 毫升
	制 成	100毫升

〔制法〕 取新鲜猪胆汁，加 3 倍量 95%乙醇，搅匀，放置 24 小时以上，过滤，滤液回收乙醇，再加 3 倍量 95%乙醇，按上法处理 1~2 次，至无沉淀为止，回收乙醇至无醇味，加苯甲醇，加注射用水至 100 毫升，搅匀，过滤，灌封，灭菌，检查，即得。

〔用途〕 用于各种急性细菌性炎症，上呼吸道感染、小儿肺炎等。

〔用法〕 肌肉注射，每次 2~4 毫升，每日 2 次。穴位注射，每次 0.3~0.5 毫升。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县通运堡公社大黑山医疗站。

八

〔处方〕	鲜鸭跖草	600克
	苯 甲 醇	2 毫升
	吐温—80	9 滴
	制 成	100毫升

〔制法〕 取鲜鸭跖草，加水煎煮 2 次，每次煮沸 1 小时，过滤，合并 2 次滤液，置水浴上浓缩至 100 毫升，加入 3 倍

量95%乙醇，搅匀，静置24小时，过滤，回收乙醇。在按上法用95%乙醇处理1~2次至无沉淀为止，回收乙醇至无醇味，加苯甲醇，吐温—80，加注射用水至100毫升，过滤澄明，灌封，灭菌，检查，印字即得。

〔用途〕 用于肺炎、上呼吸道感染、疖肿等。

〔用法〕 肌肉注射，每次2毫升，每日2次。

〔临床疗效〕 经该医院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟地区医院。

坐骨神经痛

〔处方〕	当 归	50克
	黄 芪	25克
	五加皮	25克
	乌 梅	15克
	制川乌	50克
	制草乌	25克
	海风藤	25克
	金银花	75克
	白 芍	25克
	三 七	10克
	杜 仲	25克
	莪 术	15克
	红 糖	150克

〔制法〕 将上药放在1500毫升白酒

中浸泡 7 天即得。

〔用途〕 用于坐骨神经痛。

〔用法〕 内服，每次服药酒 5 ~ 10 毫升，每日 2 次。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县新甸公社医院。

二

〔处方〕	炙黄芪	25克
	羌活	20克
	地龙	15克
	牛膝	15克
	乳香	15克
	红花	10克
	杜仲炭	25克
	甘草	10克

〔制法〕 水煎。

〔用途〕 用于坐骨神经痛。

〔用法〕 内服，黄酒为引，日服 2 次，1 日 1 剂。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县新甸公社医院。

三

〔处方〕 地龙 10克
鸭蛋 1个

〔制法〕 将地龙研成细粉，鸭蛋打碎放在地龙粉里搅匀，油煎备用。

〔用途〕 用于坐骨神经痛。

〔用法〕 内服，1 次 1 个，每日 1 次。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效

果较好。

〔处方来源〕 凤城县汤山城公社医院。

四

〔处方〕 防风 25克
五加皮 25克
寄生 25克
独活 25克
续断 25克
木瓜 25克

〔制法〕 水煎。

〔用途〕 用于坐骨神经痛。

〔用法〕 内服，1日1剂，分早、晚2次服。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 市郊区鸭绿江公社医

院。

风 湿 症

一

〔处方〕 生草乌 15克
生川乌 15克
乌梅 15克
双花 15克
甘草 15克

〔制法〕 将上药加白糖20克，用60°白酒1500毫升浸泡3天即得。

〔用途〕 用于腰腿疼痛、四肢麻木、半身不遂等症。

〔用法〕 内服，每日服1次，1次5毫升。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 凤城县中医院。

〔注〕 服此药最多不能超过 7 毫升，如过量可引起头昏、恶心、呕吐等。心脏病患者及孕妇忌服。

如无生草乌、生川乌，用制草乌、制川乌亦可。

二

〔处方〕 茜 草 100克

〔制法〕 用白酒100毫升浸泡 7 天。

〔用途〕 用于腰腿痛。

〔用法〕 内服，每次10毫升，每日 2 次。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 凤城县草河公社医院。

三

〔处方〕 地 枫 15克

年 见 20克

老鹤草 40克

甘 草 10克

红 糖 100克

〔制法〕 将上药用白酒1000毫升浸泡 7 天。

〔用途〕 用于风寒痹症。

〔用法〕 内服，早、晚各服 5 ~ 10 毫升。病在上肢饭后服，病在下肢饭前服。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 东沟县东尖山公社古家大队医疗站。

〔注〕 如风寒侵入上肢，引起肩背

6 7 8 9 20 1 2
痛不能抬举者，加桂枝10克、秦艽15克、红花10克。

风寒侵入下肢，膝关节以下痛者，加牛膝20克、肉桂15克。

若关节肿，用老鸛草捣烂加白酒敷患处。（用法将药用布袋包好，以酒浸透敷之。）

四

〔处方〕	老鸛草	500克
	牛 膝	250克
	泽 兰	250克
	茜 草	100克

〔制法〕 将上药共研细粉，过80目筛，混匀，炼蜜为丸，每丸重10克。

〔用途〕 用于风湿性关节炎、腰腿痛、肢体麻木等。

〔用法〕 内服，每次1丸，日服2

次，用黄酒或白开水送服。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 市郊区五龙背公社五龙背大队合作医疗站。

五

〔处方〕 老鸛草 50克

〔制法〕 水煎。

〔用途〕 用于风湿症。

〔用法〕 内服，日服2次，每日1剂。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 岫岩县岭沟公社医疗站。

六

〔处方〕 豨莶草 25克
威灵仙 25克
五加皮 25克
落新妇 25克

〔制法〕 共为细末，水泛丸。

〔用途〕 用于风湿症。

〔用法〕 内服，日服2次，每次10克。

〔临床疗效〕 经本院临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社医院。

七

〔处方〕 荞面 适量
鸡蛋清 一个

〔制法〕 混合搅匀。

〔用途〕 用于风湿性关节炎。

〔用法〕 敷患处。

〔临床疗效〕 经本院临床观察，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

〔注〕 止痛效果好。

八

〔处方〕 斑蝥 1个

〔制法〕 将斑蝥去头足，用蜜或蛋清适量调成膏。

〔用途〕 用于风湿性关节炎。

〔用法〕 外用，敷患处。

〔临床疗效〕 经本院临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

〔注〕 本方止痛效果好。

九

〔处方〕 止痛片 2片
炙马前子 0.5克

〔用途〕 用于风湿性关节炎。

〔用法〕 一次白开水送服。

〔临床疗效〕 经本院临床观察，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

十

〔处方〕 老棒葱 250克

鲜姜 250克

生艾叶 50克

〔制法〕 将老棒葱、鲜姜捣碎，和生艾叶一起放在盆中，加水煮沸。

〔用途〕 用于风湿症。

〔用法〕 先熏后洗，1日1次。

〔临床疗效〕 经本院临床观察，效果很好

〔处方来源〕 丹东市第一医院。

十一

〔处方〕 真 蘑 500克

公鸡骨 1具

〔制法〕 焙干研面。

〔用途〕 用于类风湿。

〔制法〕 日服2次，1次5~10克。

〔临床疗效〕 经本院临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县前营公社医院。

〔注〕 四斤以上的公鸡入药。

十二

〔处方〕 豨莶草 1500克

威灵仙	2500克
红 花	500克
炒苍术	2500克
防 风	2500克

〔制法〕 将豨薟草、红花煎煮，浓缩后，与威灵仙、苍术、防风细粉，打成水丸，丸重0.1克，分装成包，每包重1.5克。

〔用途〕 用于风湿性关节炎。

〔用法〕 1天3次，每次1包。

〔临床疗效〕 经本院临床观察，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县汤沟公社医院。

十三

〔处方〕	鲜威灵仙根	适量
	高 粱 米 饭	1 碗

〔制法〕 取鲜威灵仙根洗净捣烂，再与高粱米饭合捣成糊状。

〔用途〕 用于风湿症。

〔用法〕 外敷疼痛处。

〔临床疗效〕 经本人使用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县黄花甸旅社服务员王××

〔注〕 用此方外敷后，局部往往起泡，将泡破开，放出积水，风干即愈。

十四

〔处方〕	威灵仙	
	草 乌	
	苦 参	
	苦 菜	各等量

〔制法〕 以上4药都用鲜的，将其水煎煮过滤，滤液浓缩，加淀粉和凡士

林，使成羔状。

〔用途〕 用于风湿性关节炎。

〔用法〕 外敷患处。

〔临床疗效〕 经应用，效果良好。

〔处方来源〕 凤城县沙里寨公社白尖大队合作医疗站。

〔注〕 敷后皮肤发痒。

半身不遂

一

〔处方〕	白 酒	200毫升
	红 糖	250克
	胡 椒	280粒
	鲜 姜	50克
	茴 香	25克
	红 枣	20个
	竹 叶	10克

〔制法〕 将胡椒、姜、茴香、红枣、竹叶放在沙锅内加水1500毫升水煎，煎成250毫升，连煮3次合并一起共750毫升共服5天。

〔用途〕 半身不遂。

〔用法〕 每次用红糖一匙，白酒一盅半为引送服。

〔临床疗效〕 经该站临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县石庙公社大沟大队医疗站。

二

〔处方〕	马蛇子	1个
	苍耳子	15克
	蝉 蛻	20克

〔制法〕 马蛇子焙成灰，苍耳子焙黄，蝉蛻焙黄，共研细末。

〔用途〕 半身不遂。

〔用法〕 一次黄酒送。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，效果好。

〔处方来源〕 市郊区九连城地区医院。

面 神 经 麻 痹

一

〔处方〕 蓖麻子仁 50克

冰 片 1.5克

〔制法〕 将上 2 味药混合一起捣烂。

〔用途〕 面神经麻痹。

〔用法〕 外敷患处 1 ~ 2 小时，每日 1 次。

〔临床疗效〕 经本站临床观察，效

果良好。

〔处方来源〕 东沟县马家店公社油坊合作医疗站。

二

〔处方〕 老鹳草 15克

勾 屯 15克

甘 草 15克

防 风 15克

白 酒 500毫升

〔制法〕 上药用白酒浸泡24小时，滤过。

〔用途〕 面神经麻痹。

〔用法〕 每日 4 ~ 5 次，每次10毫升。

〔临床疗效〕 经本院临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县前营医院。

胃 痛

一

〔处方〕 陈山核桃仁 适量

〔制法〕 炒焦研面。

〔用途〕 用于寒性胃痛。

〔用法〕 每日1次，每次15克，用黄酒冲服。

〔临床疗效〕 经本站临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社木岭大队医疗站。

一

〔处方〕 辣 椒 50克

蜂 蜜 250克

〔制法〕 合一起捣匀。

〔用途〕 用于寒性胃痛。

〔用法〕 每日早、晚各10克。

〔临床疗效〕 本站临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 ××县××公社新辽大队医疗站。

三

〔处方〕 元 胡 500克

50%醇 适量

醋 酸 适量

〔制法〕 将元胡碾成粗粉，置有盖容器中，加酸性醇（50%的乙醇中，加入醋酸变酸性使PH=4）600毫升，均匀湿润后，放置2小时，然后按渗漉法继续加入酸性醇制成1000毫升即得。

〔用途〕 用于胃痛和各种平滑肌痉挛疼痛。

〔用法〕 口服，每日3次，每次10

毫升。

〔临床疗效〕 经该站临床观察，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县通远堡公社大黑山医疗站。

四

〔处方〕	木 香	10克
	佛 手	30克
	良 姜	10克
	肉 桂	10克
	荜 拔	10克
	内 金	10克
	苏打粉	100克

〔制法〕 先将前 6 味药研成细末，再加入苏打粉调匀。

〔用途〕 用于胃痛。

〔用法〕 每日 2 次，早晚分服，每

次 10 克，白开水送。

〔临床疗效〕 经本站临床观察，效果很好。

〔处方来源〕 市郊区同兴公社卫生院。

溃 瘍 病

一

〔处方〕	牡 蛎	8000克
	氧化镁	500克
	甘 草	800克
	重 曹	4000克

〔制法〕 将牡蛎、甘草粉碎，再与氧化镁、重曹混合，过 100 目筛，搅匀。

〔用途〕 用于胃及十二指肠溃疡。

〔用法〕 每日 3 次，每次 5 克。

〔临床疗效〕 经本院临床观察，效

果很好。

〔处方来源〕 丹东市中医院。

二

〔处方〕 海 蛎 10000克
重 曹 10000克
氧化镁 2500克
甘 草 3500克
薄 荷 7 克

〔制法〕 混合粉碎，过100目筛。

〔用途〕 用于胃及十二指肠溃疡。

〔用法〕 每日3次，每次3~5克。

〔临床疗效〕 经本院临床使用，效

果很好。

〔处方来源〕 丹东市第一医院。

三

〔处方〕 山 药 500克

重 曹 500克
煅牡蛎 500克
氧化镁 50克
甘 草 100克

〔制法〕 共为细粉。

〔用途〕 用于溃疡病胃酸过多。

〔用法〕 每日3次，每次2克。

〔临床疗效〕 经本院临床观察，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

四

〔处方〕 苏子油 100克
蜂 蜜 100克
核桃仁 100克
鸡 蛋 2个

〔制法〕 核桃仁捣烂，与其它药搅拌，用磁碗盛装，置锅中蒸熟备用。

〔用途〕 用于胃溃疡。

〔用法〕 每日 3 次，每次 10 克。

〔临床疗效〕 经本站临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县岭沟公社山城大队医疗站。

五

〔处方〕 新鲜猪板油 200克
山核桃仁 200克
蜂 蜜 200克
白 糖 200克

〔制法〕 将核桃仁捣碎，与其它药放在一起蒸 1 小时，放置瓶内备用。

〔用途〕 用于胃及十二指肠溃疡。

〔用法〕 每日 3 次，每次 10 克。

〔临床疗效〕 经本站应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县新屯大队医疗站。

〔注〕 忌食凉、硬、刺激性食物。

六

〔处方〕 龙胆草 25克
秦 皮 25克
鸡蛋壳 25克
洋金花 5 克

〔制法〕 将上述 4 味药干燥后，共为细末，炼蜜为丸，每丸重 5 克。

〔用途〕 用于胃溃疡。

〔用法〕 内服，每日 3 次，每次 1 丸，饭后服。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县大营子公社大营子大队医疗站。

七

〔处方〕 龙 骨
牡 蛎
海 螺 蛸

甘 草 各等份

〔制法〕 将上述4味药，共为细末。

〔用途〕 用于胃及十二指肠溃疡。

〔用法〕 内服，每日2次，每次3克，早、晚空腹服。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县中医院。

八

〔处方〕 新鲜猪肚 1个

〔制法〕 去其杂物，放在锅中炖熟。

〔用途〕 用于胃及十二指肠溃疡。

〔用法〕 内服，吃肚喝汤，不拘量。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县岭沟公社山城大队医疗站。

九

〔处方〕 红 花 50克
大 枣 12个
蜂 蜜 50克

〔制法〕 先将红花用纱布包好和大枣一同加水煎煮成约150毫升，取出红花，放入蜂蜜拌匀使成200毫升即得。

〔用途〕 用于胃溃疡。

〔用法〕 内服，日服2次，每次100毫升和6个枣。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效

果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二人民医院。

十

〔处方〕 胆 草 1500克
陈 皮 1500克
甘 草 1000克
鸡蛋壳 500克
重 曹 500克

〔制法〕 将上述 5 味药，共为细末。

〔用途〕 用于溃疡病胃酸过多。

〔用法〕 内服，日服 2 次，饭后服，每次 5 克。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县汤山城公社医院。

十一

〔处方〕 蜂 蜜 500克
獾子油 500克
白 糖 500克

〔制法〕 不见铜铁，放磁盆内用锅蒸 1 小时，放在瓶内备用。

〔用途〕 用于胃、十二指肠溃疡。

〔用法〕 内服，日服 3 次，每次 10 克，白开水送下。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县新屯大队医疗站。

十二

〔处方〕 蜂 蜜 500克
重 曹 100克

20 1 2 3 4 5
白 矾 100克

〔制法〕 先将蜂蜜文火熬至沸腾，不变色（黄色），再将白矾研成细末与重曹一併放入蜂蜜中搅拌均匀，置瓶内保存备用。

〔用途〕 用于胃、十二指肠溃疡。

〔用法〕 内服，日服3次，每次10克，1小时内不喝水。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县新屯大队医疗站。

〔注〕 服药后，可有腹胀、肠鸣，暖气感。

十三

〔处方〕 海螵蛸
白屈菜

川楝子 各等量

〔制法〕 将上述3味药，共为细末。

〔用途〕 用于胃痛、胃溃疡、胃酸过多。

〔用法〕 内服，日服2次，每次2克，白开水送下。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社后地大队医疗站。

肠 炎

—

〔处方〕 板栗锅 1个

柞树皮 100克

〔制法〕 干燥后，共为细末。

〔用途〕 用于肠炎泻痢。

〔用法〕 内服，日服3次，每次1.5克。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县石庙公社大沟大队医疗站。

二

〔处方〕 鸭 蛋 1 个

川 占 适量

〔制法〕 将川占放于锅内溶沸，打入鸭蛋煎熟。

〔用途〕 用于肠炎泻痢。

〔用法〕 内服，日服2次，每次1个，空腹服。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县赛马公社东甸大队医疗站。

三

〔处方〕 生黄土 500克

红 糖 500克

〔制法〕 将生黄土（地下深部的黄土）干燥研成细末，与红糖混匀。

〔用途〕 用于肠炎、腹泻。

〔用法〕 内服，日服3次，每次5克。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 丹东市第一医院。

四

〔处方〕 老 醋 适量

鸭 蛋 1 个

〔制法〕 用醋煎鸭蛋。

〔用途〕 用于肠炎、腹泻。

〔用法〕 内服，1次顿服。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

五

〔处方〕 白 矾 适量

鸭 蛋 1个

〔制法〕 将白矾研成细末和鸭蛋拌匀，放锅内炒熟。

〔用途〕 用于腹泻。

〔用法〕 内服，1次顿服。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 丹东市第一医院。

便秘

一

〔处方〕 咸萝卜（或肥皂）适当

〔制法〕 将咸萝卜（或肥皂）切削成适当的条状。

〔用途〕 用于大便秘结。

〔用法〕 将咸萝卜条（或肥皂条）塞入肛门内，每次1条。

〔临床疗效〕 东沟县新农公社四家子大队医疗站。

二

〔处方〕 鲜 姜 适量

〔制法〕 将鲜姜切成圆条状，备用。

〔用途〕 便秘、腹胀。

〔用法〕 把鲜姜条涂上润滑剂（如豆油等）塞入肛门。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 凤城县沙里寨公社广甸大队医疗站。

痢 疾

一

〔处方〕 白头翁 50克

炒地榆 15克

诃子肉 15克

公丁香 15克

〔制法〕 共为细末，水泛丸，赤石脂为衣。

〔用途〕 肠炎、痢疾。

〔用法〕 每日3次，每次2克，小

儿酌减。

〔临床疗效〕 经本站临床观察70余例，效果很好。

〔处方来源〕 东沟县新农公社四家大队合作医疗站。

二

〔处方〕 马齿苋 50~100克

〔制法〕 将马齿苋洗净切碎，水煎。

〔用途〕 用于防治痢疾。

〔用法〕 内服，日服2次。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

三

〔处方〕 椿根皮 20克

地榆 50克

贯众 25克

乌 梅 15克
大 枣 10个

〔制法〕 将上述5味药洗净，椿根皮、地榆、贯众切碎与乌梅、大枣加水共煎。

〔用途〕 用于防治痢疾。

〔用法〕 内服，吃枣喝汤，日服2次。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

四

〔处方〕 白头翁 15克

青 皮 15克

〔制法〕 将上述2味药洗净，切碎，水煎。

〔用途〕 用于防治痢疾。

〔用法〕 内服，日服2次。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

五

〔处方〕 黄 柏 7.5克
公 英 15克
车 前 10克

〔制法〕 将上述3味药洗净，切碎，水煎。

〔用途〕 用于防治痢疾。

〔用法〕 内服，日服2次。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

六

〔处方〕 大 蒜 适量

〔制法〕 将大蒜去皮。

〔用途〕 用于防治痢疾。

〔用法〕 内服，每次3~5瓣，日服3次，至大便正常后再继续服3天。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

七

〔处方〕 鲜马齿苋 150克
白 糖 50克

〔制法〕 将鲜马齿苋洗净捣碎，用纱布包好挤压取汁，加白糖，再加水1茶缸煎沸。

〔用途〕 用于防治痢疾。

〔用法〕 内服，日服3次，至大便正常后3天停药。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

八

〔处方〕 白头翁 50克
黄 连 10克
黄 柏 15克
秦 皮 15克

〔制法〕 将上述4味药洗净，切

碎，水煎。

〔用途〕 用于防治痢疾。

〔用法〕 内服，日服4次。

〔处方来源〕 丹东市卫生防疫站。

九

〔处方〕 鸭 蛋 1个
白 酒 100毫升
白 糖 50克

〔制法〕 先将鸭蛋打在碗里，然后将白酒温热倒在鸭蛋上，同时用筷子将鸭蛋夹碎烧熟，待酒燃尽鸭蛋已熟，趁热将白糖放入，搅拌溶化后，内服。

〔用途〕 用于慢性痢疾。

〔用法〕 内服，晚饭后1次服，小儿酌减，每日1次，重者连服3天。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

20 1 2 3
〔处方来源〕 东沟县长山公社医院。

十

〔处方〕 茧蛹皮
土黄连
狗奶根 各等量

〔制法〕 以上3味药共为细末。

〔用途〕 用于菌痢。

〔用法〕 内服，每次5克，日服2次。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

〔注〕 土黄连系小檗科植物毛黄连的干燥根。

十一

〔处方〕 高粱米糠

土黄连 各等分
〔制法〕 共为细末。

〔用途〕 用于痢疾。

〔用法〕 内服，每次5克，饭前服，日服3次。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第一医院。

十二

〔处方〕 未熟山楂 7个
百草霜 适量

〔制法〕 混合炒成炭后研末，红色痢疾加红糖，白色痢疾加白糖，用灯心草为引。

〔用途〕 用于红白痢疾。

〔用法〕 内服，用灯心草水冲服。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效

果良好。

〔处方来源〕 凤城县杨木公社台沟大队医疗站。

十三

〔处方〕： 苘麻子 50克
红、白糖 适量

〔制法〕 将苘麻子炒黄研末，加糖调成糊状，内服。赤痢加红糖，白痢加白糖。

〔用途〕 用于红、白痢疾，肠炎、腹泻等。

〔用法〕 内服，日服3次。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 市郊区蛤蟆塘公社卫生院。

十四

〔处方〕 独头蒜 适量
热面条 1碗

〔制法〕 将蒜捣碎，加面条内少闷服。

〔用途〕 用于痢疾。

〔用法〕 内服，1次服。

〔临床疗效〕 经该院观察，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第一医院。

十五

〔处方〕 独根的白头翁根 适量

〔制法〕 将白头翁根研成细粉，或加水煎服。

〔用途〕 用于菌痢。

〔用法〕 内服。

7 8 9 20
〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县大营子公社大营子大队医疗站。

十六

〔处方〕 白头翁 100克
黄 柏 50克
秦 皮 40克
苦 参 40克

〔制法〕 将上述4味药粉碎、过筛，炼蜜为丸。

〔用途〕 用于肠炎、痢疾。

〔用法〕 内服，每次1丸，口服3次。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 宽甸县青山沟公社地区医院。

肝 炎

一

〔处方〕 托盘根 50克
五味子 25克
白鲜皮 15克
茵陈蒿 25克
狗奶根 25克

〔制法〕 水煎。

〔用途〕 急、慢性肝炎，肝硬化轻度腹水。

〔制法〕 每日1剂，早晚服。

〔临床疗效〕 经本院观察，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县岭沟公社医院。

〔注〕 托盘夏秋采叶茎，春秋采

根。

二

〔处方〕 茵陈 500克
艾叶 500克
竹叶 150克
灯心 50克
白糖 500克

〔制法〕 将上4味药，用水煎3遍，将煎出液合并，再用慢火熬至1500~2000毫升加入白糖熬至1000毫升。

〔用途〕 慢性肝炎，肝硬化腹水。

〔制法〕 每日3次，每次1食匙。

〔临床疗效〕 经本院临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 宽甸县牛毛坞地区医院。

三

〔处方〕 狗奶根 7500克
佛手 1000克
板兰根 1000克
糖 5000克

〔制法〕 将上药水煎后过滤浓缩加入糖溶解，加水至10000毫升，搅匀即得。

〔用途〕 清热利胆，各种肝炎。

〔用法〕 每日3次，每次15毫升。

〔临床疗效〕 本院门诊使用观察，效果良好。

〔处方来源〕 丹东市中医院。

〔注〕 长期保存必加入适当的防腐剂。

四

〔处方〕 青黛 适量

20-1-2-3
〔用途〕 黄疸型肝炎

〔用法〕 3~5岁每次服1克，
6~9岁每次服2克，10~16岁每次服3
克。口服2次。

〔临床疗效〕 经本院临床观察，效
果良好。

〔处方来源〕 凤城县中医院。

五

〔处方〕 银 珠 桃 仁
 黑 矾 红 枣
 葱 白 红 糖
 生 姜 白 面 各等量

〔制法〕 将上述7味药，共为细
末，用白面制成小糊丸，如小豆粒大小。

〔用途〕 用于肝硬化腹水，肝炎。

〔用法〕 内服，口服2次，每次4
~5粒。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效
果良好。

〔处方来源〕 宽甸县医院。

〔注〕 服药期间忌食牛羊肉、芥

六

〔处方〕 黄鼠狼子头 1个
 野鸡脖子蛇 1条

〔制法〕 焙干研末。

〔用途〕 用于肝硬化。

〔用法〕 内服，口服1次，每次
2.5克，黄酒送服。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效
果良好。

〔处方来源〕 凤城县通远堡公社小
黑山大队医疗站。

肾 炎

一

〔处方〕 白茅根 50克

〔制法〕 水煎汤剂。

〔用途〕 用于肾炎、膀胱炎、尿血。

〔用法〕 日服2次。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县前营子公社燕窝大队医疗站。

二

〔处方〕 萝 摩 100克

〔制法〕 水煎煮。

〔用途〕 肾炎。

〔用法〕 1次服用

〔临床疗效〕 经该院临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 宽甸县杨木川医院。

三

〔处方〕 石灰水 (取上清液)

〔制法〕 用石灰水煮面条。

〔用途〕 慢性肾炎，浮肿。

〔用法〕 吃面条适量。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 凤城县汤山城公社医院。

四

〔处方〕 霜打葫芦 适量

〔制法〕 水煎煮。

〔用途〕 慢性肾炎，浮肿。

〔用法〕 日服3次。

〔临床疗效〕 经该站临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县岭沟公社三河大队医疗站。

五

〔处方〕 双花 30克
连翘 15克
苇根 20克
泽泻 15克
茅根 25克
车前子 15克

〔制法〕 水煎煮。

〔用途〕 急性肾炎。

〔用法〕 每日1剂，早晚分服。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县岭沟公社医院。

六

〔处方〕 生黄芪 100克
竹叶 15克
车前子 15克

〔制法〕 水煎煮。

〔用途〕 急性肾炎。

〔用法〕 日服2次。

〔临床疗效〕 经该站临床观察，效果良好。

〔处方〕 岫岩县老窝大队医疗站。

七

〔处方〕 霜打茄子杆和小茄子适量
红皮鸡蛋 7个

〔制法〕 将茄子杆烧成灰，用水

8 9 20 1 2
淋，并放锅内烧开，将小茄子3~7个放入锅内再打鸡蛋。

〔用途〕 急性慢性肾炎。

〔用法〕 吃蛋喝水。

〔临床疗效〕 经该站临床观察，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县新建大队医疗站。

肾 孟 肾 炎

一

〔处方〕 益母草 200克

〔制法〕 水煎汤。

〔用途〕 肾盂肾炎。

〔用法〕 1次服下。

〔临床疗效〕 经该站临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县石庙公社东堡大队医疗站。

二

〔处方〕 鲜鲫鱼 1条
鲜 姜 7片
黑胡椒 7粒
大 枣 7个
葱 须 适量

〔制法〕 将鱼去内脏，把4味药捣碎放入鱼肚内，用黄泥将鱼裹住，用文火焙干，研成细面。

〔用途〕 肾盂肾炎。

〔用法〕 用黄酒适量冲服。

〔临床疗效〕 经该站临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县新屯大队医疗站。

腹 水

一

〔处方〕 癭蛤蟆 1个
砂 仁 15克

〔制法〕 将砂仁放到去内脏的癭蛤蟆腹内，用黄泥包好，焙黄研成细面。

〔用途〕 单纯性腹水。

〔用法〕 日服1次，取适量用黄酒送下。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 市郊区九连城公社医院。

二

〔处方〕 川 军 20克

木 通 20克

黄 豆 300克

〔制法〕 将川军、木通用布袋装好与黄豆同时放入锅内煮至豆烂即可。

〔用途〕 各种浮肿。

〔用法〕 吃豆喝汤，分3次服下。

〔临床疗效〕 经该站临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 市郊区马沟大队合作医疗站。

〔注〕 服药后少吃盐类。

水 肿

一

〔处方〕 老黄瓜 1个

〔制法〕 用醋煮烂去渣。

〔用途〕 水肿。

〔用法〕 空腹服用，每次适量。
〔临床疗效〕 经该站临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 东沟县新沟公社宜城大队医疗站。

二

〔处方〕 老黄瓜汁 750毫升
蜂 蜜 50克
黄 酒 50毫升
鸡 蛋 1个

〔制法〕 先将黄瓜汁煎开，然后放蜂蜜、黄酒、鸡蛋。

〔用途〕 单纯性下肢水肿。

〔用法〕 日服 1 剂，连服 2 ~ 3 剂。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，效果很好。

〔处方来源〕 市郊区九连城公社医院。

胆囊炎、胆石症

〔处方〕 连钱草 50~100克

〔制法〕 水煎。

〔用途〕 用于胆囊炎、胆石症。

〔用法〕 口服 2 次，每日 1 剂。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县岭沟公社医院。

胆 道 蛔 虫

〔处方〕 乌 梅 15克

川 椒 5 克
苦 参 25克

〔制法〕 水煎。

〔用途〕 胆道蛔虫。

〔用法〕 一次顿服。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

二

〔处方〕 乌 梅 50克
苦 参 25克
川 椒 10克
木 香 20克

〔制法〕 将上述 4 味药加 4 ~ 6 倍量水煎者。煎煮液用石灰乳法脱蛋白，取上清液浓缩至100毫升。

〔用途〕 用于胆道蛔虫症。

〔用法〕 日服 2 次，每次50毫升。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

三

〔处方〕 乌 梅 20克
黄 连 10克
川 椒 15克
元 胡 15克
藿 香 20克
白 芍 15克
榔 片 15克

〔制法〕 水煎服。

〔用途〕 胆道蛔虫症和胆道感染。

〔用法〕 每付水煎 2 次，痛时服用。

〔临床疗效〕 经本院观察，效果良好。

20 1 2 3
〔处方来源〕 岫岩县新甸公社医院。

驱 虫

一

〔处方〕 南瓜子 50克
芒 硝 5克
苦楝皮 25克
槟 榔 100克

〔制法〕 将上述药物，加水煎之。

〔用途〕 用于驱绦虫。

〔用法〕 1周1次，空腹顿服。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，疗效好。

〔处方来源〕 丹东市第一医院。

头 痛

一

〔处方〕 大 黄 25克
白 酒 适量

〔制法〕 大黄研成细粉，用白酒调

匀。

〔用途〕 治头痛。

〔用法〕 将药外敷太阳穴处。

〔临床疗效〕 经该院临床20多例，效果良好。

〔处方来源〕 丹东市中医院。

二

〔处方〕 大 黄 25克
黄 芩 250克
梔 子 150克

龙胆草 150克

肉桂 50克

〔制法〕 共为细末，炼蜜为丸，每丸5克。

〔用途〕 上焦火盛，口舌生疮，头痛。

〔用法〕 每日3次，每次1丸。

〔临床疗效〕 经该院观察，有效率80%。

〔处方来源〕 岫岩县洋河地区医院瓦房大队合作医疗站。

三

〔处方〕 川 乌 5克

草 乌 5克

白 芷 5克

细 辛 5克

〔制法〕 共为细末，以等量白面，

加白酒适量调成膏状。

〔用途〕 各种类型头痛。

〔用法〕 以适量药膏敷头部，到不痛止。

〔临床疗效〕 经本院临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县哨子河医院。

神经性头痛

一

〔处方〕 白 芷 50克

冰 片 1克

〔制法〕 先将白芷研细末，再加入冰片共研。

〔用途〕 神经性头痛。

〔用法〕 取少许由鼻吸入。

〔临床疗效〕 经本院临床观察，效

果良好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

二

〔处方〕 川 芎 400克
生石膏 400克
白 芷 400克
细 辛 200克

〔制法〕 共为细粉，泛丸。

〔用途〕 神经性头痛。

〔用法〕 每日2次，每次25克。

〔临床疗效〕 经该院观察，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县草河公社医院。

偏 头 痛

一

〔处方〕 白 芷 10克
细 辛 10克

〔制法〕 共研细末。

〔用途〕 偏头痛。

〔用法〕 取适量水调，敷于太阳穴处。

〔临床疗效〕 经本院临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 丹东市滨江卫生所。

二

〔处方〕 升 麻 1000克
白 芷 1000克
甘 草 250克

〔制法〕 将上述3味药粉碎，过120目筛，以水泛丸，10粒相当重5克。

〔用途〕 风湿性头痛，偏头痛，神经性头痛，牙痛。

〔用法〕 每日3次，每次10～15粒。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，群众反映对慢性头痛效果良好。

〔处方来源〕 凤城县沙里寨公社亮子河医疗站。

风 热 头 痛

〔处方〕 鲜薄荷 适量

〔制法〕 将鲜薄荷捣烂。

〔用途〕 风热头痛。

〔用法〕 外敷太阳穴。

〔临床疗效〕 经本院临床观察，效果良好。

〔处方来源〕 凤城县汤山城医院。

牙 痛

〔处方〕 甘 草 10克

大 黄 10克

陈 皮 10克

皮 硝 10克

〔制法〕 前3种药煎液加皮硝。

〔用途〕 各种牙痛。

〔用法〕 每日服1剂。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 凤城县中医院。

〔注〕 有不同程度的腹泻时，立即

停药。孕妇忌用。

二

〔处方〕 轻 粉 0.5克
独头蒜 适量

〔用途〕 牙痛。

〔用法〕 将蒜对称切开，切开面蘸取轻粉，左面疼，放右手脉膊处。右面疼，反之。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 凤城县汤山城医院。

三

〔处方〕 细 辛 1克

〔用途〕 牙痛。

〔用法〕 取细辛放在痛牙上，咬着。口水吐出。

〔临床疗效〕 经该站应用，效果良好。

〔处方来源〕 东沟县马家岗大队医疗站。

〔处方〕 枯 矾 适量

〔制法〕 研细面。

〔用途〕 牙痛。

〔用法〕 吹入鼻内。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社小偏岭医疗站。

〔处方〕 生石膏 50克
寒水石 25克

青 黛 10克

〔制法〕 上药研为细末，用水调，放锅内蒸1小时，凉后晒干，再研细粉。

〔用途〕 内热发燥，心烦，目赤，尿黄，牙痛。

〔用法〕 每日2次，每次15克。小儿减量。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 市郊区同兴公社医院。

六

〔处方〕 红尖椒 适量

烧 酒 适量

〔制法〕 将不破碎的红尖椒，除蒂除籽，将烧酒装入红尖椒内，用火烤尖椒，酒出白气为度。放洗净的小瓶内，密

封备用。

〔用途〕 牙痛。

〔用法〕 用棉球蘸取药液，咬在患牙处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 市郊区蛤蟆塘公社医院。

吐 血

〔处方〕 荷叶炭 5克

当 归 50克

〔制法〕 将上述药物，加黄酒炖沸。

〔用途〕 用力过猛咯血。

〔用法〕 1次服下。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，疗效较好。

〔处方来源〕 岫岩县石庙公社医院。

各种出血

〔处方〕 小蓟汁 200毫升

白矾粉 15克

〔制法〕 取新鲜小蓟，用压榨法取其汁，临用时与白矾粉混合即得。

〔用途〕 用于各种出血。

〔用法〕 口服2次，每次50毫升。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，疗效很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

牙龈出血

〔处方〕 生石灰 适量

白糖 适量

〔制法〕 将生石灰研为细末，再加白糖研匀即可。

〔用途〕 用于牙龈出血。

〔用法〕 将药面少许，撒于患处，压迫片刻即止。

〔临床疗效〕 经该站临床观察，疗效很好。

〔处方来源〕 东沟县新农公社四家大队合作医疗站。

便血

〔处方〕 椿白皮 50克

人 参 10克

车前子 10克

甘 草 10克

生 姜 6片

红枣去核 3个

〔制法〕 先将椿白皮炒至黑黄色，再加入其他药物，用水煎之。

〔用途〕 便血症。

〔用法〕 1付药煎2次，早晚分服。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，对久治无效的便血症有特效。1~3付即愈。

〔处方来源〕 东沟县长安公社医院。

尿 血

〔处方〕 生 地 50克

地 榆 50克

〔制法〕 将以上药物，用3碗水煎至多半碗即可。

〔用途〕 用于尿血症。

〔用法〕 空腹服用。

〔临床疗效〕 经该站观察，疗效较好。

〔处方来源〕 东沟县汤池公社萌芽大队合作医疗站。

尿 毒 症

〔处方〕 家核桃 1个

蜈 蚣 1条

〔制法〕 将家核桃打个洞，把蜈蚣放到核桃内，焙黄，研成细面。

〔用途〕 尿毒症。

〔用法〕 用黄酒1次送下。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，疗效良好。

〔处方来源〕 市郊区九连城地区医院。

尿 潴 留

〔处方〕 大 葱
白 矾 各适量

〔制法〕 将上述药物捣烂，共为糊状。

〔用途〕 用于小便不利，尿闭等症。

〔用法〕 敷肚脐。

〔临床疗效〕 经该站临床观察，2小时后即有效。

〔处方来源〕 东沟县十字街公社龙山医疗站。

神 经 衰 弱

一

〔处方〕 雄 黄 1克
鸡 蛋 1个

〔制法〕 将鸡蛋打碎，放入碗中，加入雄黄末搅匀，用豆油炒熟即得。

〔用途〕 用于神经官能症。

〔用法〕 日服1次，连服2天停1天。再服2天。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县石庙子公社医院。

二

〔处方〕 生五味子 75克

合欢花 25克
何首乌 15克
玉竹 25克
红 糖 150克

〔制法〕 将前4味药水煎2次，弃渣，将两次药液合并，浓缩成500毫升，后加红糖热溶即得。

〔用途〕 用于神经衰弱，健忘失眠。

〔用法〕 口服3次，每次15毫升。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 东沟县新农公社四家子大队医疗站。

三

〔处方〕 丹 参 500克
朱 砂 10克

〔制法〕 将上述2味药共为细粉，制成水泛丸。

〔用途〕 用于神经官能症、失眠。

〔用法〕 口服3次，每次5克。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 凤城县草河公社医院。

四

〔处方〕 鲜百合 500克
炒枣仁 50克

〔制法〕 先将鲜百合用凉水浸泡24小时后，洗净，再将炒枣仁用水煎沸，取汁加入百合，待百合煮熟后，用白醋拌之。

〔用途〕 用于神经衰弱。

〔用法〕 每晚服1次，每次50克。

【临床疗效】 经该院临床应用，效果很好。

【处方来源】 宽甸县毛甸子公社医院。

五

【处方】 五味子 250克

白 糖 250克

【制法】 将上述2味药加自来水1500~2000毫升，浸提即得。

【用途】 用于神经衰弱，神经官能症。

【用法】 当茶饮。

【临床疗效】 经该院临床应用，效果很好。

【处方来源】 凤城县凤山公社中队长队医院。

【处方】

【制法】

去渣即得。

【用途】

症。

【用法】

毫升。

【临床疗效】

果很好。

【处方来源】

院。

七

【处方】 淫羊藿叶 300克

合欢 300克
福寿草 50克

〔制法〕 先将淫羊藿叶、合欢加水煎煮3次，去渣。合并3次煎煮液浓缩后，加福寿草煎沸30分钟，去渣，继续浓缩至2500毫升即得。

〔用途〕 用于神经衰弱，神经性心悸，失眠，多梦，及由神经衰弱所致的恶心，头晕，四肢无力，饮食不振。

〔用法〕 每日早饭前，午、晚饭后服用，每次15~20毫升。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 市郊区五龙背公社五龙背大队医疗站。

八

〔处方〕 牛（猪）苦胆 3个

大黄 150克
冰片 7.5克
木香 100克
赭石 150克
远志 10克
朱砂 10克

〔制法〕 先将胆汁熬干，与其它药物粉末混匀，用苦胆皮煎的水，制成水泛丸即可。

〔用途〕 用于神经官能症，失眠，心悸，胃胀，便秘等症。

〔用法〕 每日早、晚各服1次，每次5克。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 市郊区九连城公社医院。

癩 痢

一

〔处方〕 糊溜溜（多年炕洞或烟囱
的烟溜）适量
陈 曲 25克
黑胡椒（以年岁为度，每
岁1粒，20粒为限）

黄 酒 50~1000毫升

〔制法〕 先将陈曲在瓦片上焙干，
过筛，再将糊溜溜和胡椒研面，混合即
得。

〔用途〕 用于癩痢。

〔用法〕 每晚将上药面用温黄酒冲
服。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，疗
效良好。

〔处方来源〕 宽甸县八河川公社样
册子大队医疗站。

〔注〕

制药时不要见铁器。

产妇、临产、产褥期忌服。

服药后忌酸、辣、凉、硬食物。

二

〔处方〕 朱 砂
枣 仁 各等量

〔制法〕 将上述2味药共为细粉即
得。

〔用途〕 用于癩痢，神经衰弱。

〔用法〕 日服1次，每次2克。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效
果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

三

〔处方〕 炙马钱子粉 2.5克
 缬草浸膏 10克
 骨 粉 200克
 樟 脑 8.5克
 苯巴比妥 50克
 溴化钠 124克

〔制法〕 将上述6味药混匀，共制成1000片。每片重0.4克

〔用途〕 用于癫痫。

〔用法〕 口服3次，每次1~2片。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 丹东市第二人民医院。

高 血 压

〔处方〕 食 醋 250毫升
 白 糖 250克
 蜂 蜜 250克

〔制法〕 将上述3味药混合，溶解后备用。

〔用途〕 用于高血压。

〔用法〕 口服3次，每次10毫升。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕：市郊区浪头公社浪头大队医疗站。

遗 精

〔处方〕 炒枣仁 15克

炙远志 15克
茯苓 15克
莲子肉 15克
炒山药 50克
人参 5克
甘草 5克

〔制法〕 先将炒枣仁捣碎后，与其它药物一起水煎之，去渣即得。

〔用途〕 用于真元亏损、心肾不交、遗精滑泄、盗汗虚烦、腰腿酸疼。

〔用法〕 每日1剂、早、晚各服1次。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市中医院。

眩 晕 症

〔处方〕 泽泻 50克
白术 50克

〔制法〕 将上述2味药共为细末。

〔用途〕 眩晕症。

〔用法〕 日服3次，每次5克。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

淋巴、骨结核

〔处方〕 蛇血（长虫血）

〔制法〕 用刀割蛇颈，收集血。

〔用途〕 用于骨结核，腰椎结核。

〔用法〕 外用，将血滴入疮口内。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 东沟县十字街公社棋盘医疗站。

二

〔处方〕 杨树皮 适量

〔制法〕 将杨树皮剥去外皮，加水反复煎煮，煎至流浸膏状。

〔用途〕 用于治疗骨结核，淋巴腺结核。

〔用法〕 外用，将药膏贴于患处，3～5天换一次。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 凤城县中医院。

三

〔处方〕 大蒜 1头
白酒 适量

〔制法〕 将大蒜放入白酒中浸泡15分钟左右，然后取出捣碎。

〔用途〕 用于淋巴腺结核破溃者。

〔用法〕 外敷于患处，每日敷1次，每次敷1小时，每星期休1天。敷药后头一周到第二周变红肿多，然后渐渐萎缩。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 岫岩县大营公社卫生院。

四

〔处方〕 红矾 15克

红 枣 30个
巴豆仁 15个 (30个巴
豆瓣)

〔制法〕 将15克红矾研成细末，分成30等份。取一份红矾，一个巴豆瓣，装入一个红枣里，然后用线麻将红枣的切口处扎紧备用。

〔用途〕 用于治疗淋巴腺结核。

〔用法〕 每天晚睡前2小时，将红枣2个放入50°白酒中浸泡2小时（根据红枣的干湿度，缩短或延长浸泡时间），然后取出放在两手心内，五指握住大枣，用手帕包好固定，第二天早起床时，把红枣取出烧掉（以免误食）。连握6天，停握1天。

〔临床疗效〕 该所总结40例患者，总有效率82.5%，临床治愈5例，显效10例，有效18例。

典型病例：

韩××，男，6岁，患儿左颈部长疙瘩数月，表皮不红，近十几天来，因疼痛曾到卫生所及市医院治疗无效，后到该所就诊。

面部所见：

左颈下，淋巴结呈鹅蛋大，左耳前下方颈淋巴结肿大如红枣大，其表皮不红，触之无痛感，质较硬，活动。

结核菌素试验（+），胸透正常。

经用此方治疗，两处肿大的淋巴结，均全部吸收，未留硬结。

〔处方来源〕 丹东市结核防治所
丹东市结核病医院

五

〔处方〕 黄 柏
石 羔

轻 粉

红 粉

银 珠

各等量

于上药成1:1

〔制法〕 将上述5味药共为细末，制成纱布条。

〔用途〕 用于骨结核。

〔用法〕 外用，将适量纱布条放入患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭医院。

六

〔处方〕	红 参	5 克
	鹿 茸	5 克
	乳 香	7.5克
	没 药	7.5克
	朱 砂	5 克

血 竭 10克

银 珠 10克

蟾 酥 5 克

芦 荟 5 克

〔制法〕 将上述9味药共为细末，制成纱布条。

〔用途〕 用于骨结核。

〔用法〕 外用，取适量纱布条放入患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第一医院。

妇 产 科

子 宫 功 能 性 出 血

一

〔处方〕 地榆炭
血余炭
红旱莲
茜 草 各等量

〔制法〕 将上述4味药，共为细末。

〔用途〕 用于子宫功能性出血。

〔用法〕 内服，口服3次，每次10克。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩石庙公社大沟大队医疗站。

二

〔处方〕 地榆炭 25克
地骨皮 15克

〔制法〕 将上述2味药，加米醋200毫升，文火煎煮至70毫升，去渣，药液加白糖少许。

〔用途〕 子宫功能性出血。

〔用法〕 口服，每天1剂，分3次服。一般可连服2~4剂。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，疗效良好。

〔处方来源〕 丹东市蛤蟆塘卫生院。

三

〔处方〕 党 参 150克
黄 芪 250克

〔制法〕 将上述 2 味药加水适量，煎煮 3 次，将 3 次滤液合并。

〔用途〕 子宫功能性出血。

〔用法〕 制得的药液，分 2 次服。

〔临床疗效〕 经该院临床观察，疗效很好。

〔处方来源〕 岫岩县洋河公社唐家大队合作医疗站。

四

〔处方〕 黄 芪 50克
艾叶炭 100克
升 麻 15克

〔制法〕 将上述 3 味药加适量水煎

煮 20 分钟。

〔用途〕 子宫功能性出血。

〔用法〕 口服，一次服下。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 丹东市第一医院。

五

〔处方〕 锅底灰
黄 酒 适量

〔制法〕 将锅底灰用黄酒调匀。

〔用途〕 月经过多，淋漓不止。

〔用法〕 口服适量，每日 3 次。

〔临床疗效〕 经该站临床观察，疗效较好。

〔处方来源〕 岫岩县洋河公社唐家堡大队合作医疗站。

六

〔处方〕 高粱米淘米水 适量
猪下巴骨 适量

〔制法〕 将猪下巴骨焙成炭，研成细末，加入适量高粱米淘米水加温备用。

〔用途〕 月经过多，淋漓不止。

〔用法〕 日服2次，每次服一碗。

〔临床疗效〕 经该站临床观察，疗效良好。

〔处方来源〕 岫岩县偏岭公社五间房大队合作医疗站。

因 寒 痛 经

〔处方〕 黑胡椒 25克
芥 面 25克
百草霜 25克

枯 矾 25克

〔制法〕 将上述药物共研细末。

〔用途〕 妇女因寒痛经，小腹疼痛。

〔用法〕 外用，将药末用热白酒调匀，涂于布上敷肚脐。

〔临床疗效〕 经该站临床观察，疗效较好。

〔处方来源〕 岫岩县岭沟公社山城大队合作医疗站。

寒 性 腰 腿 痛

〔处方〕 刺楸树枝 250克

〔制法〕 取刺楸树枝250克加水1000毫升，煎煮至100毫升。

〔用途〕 妇女寒性腰腿痛。

〔用法〕 口服，每天2次，每次50

毫升。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县中医院。

产后流血不止

〔处方〕 红人参 50克
芥穗炭 15克

〔制法〕 将上述2味药加适量水煎煮15分钟。

〔用途〕 产后流血不止。

〔用法〕 口服，频频服用，注意观察。

〔临床疗效〕 经该站临床观察20余例，疗效良好。

〔处方来源〕 东沟县十字街公社安全大队合作医疗站。

产后四肢麻木

〔处方〕 鲛鱼 250克
黄酒 250毫升

〔制法〕 将上述2味药放入砂锅，煎煮至鱼熟为度服用，剩下骨刺重煎煮至酥，再服吃。冬春季可以不去内脏（注意去胆）。

〔用途〕 产后四肢麻木。

〔用法〕 口服，早晚2次，连服3天，服后发汗。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，疗效很好。

〔处方来源〕 市郊区五龙背九道大队医疗站。

产 后 缺 乳

〔处方〕 勾 电 15克
鸡 蛋 3个

〔制法〕 将勾电加水500毫升，煎煮20分钟过滤去渣，将鸡蛋打入药液内（不搅拌，成荷包蛋状）。

〔用途〕 产后缺乳。

〔用法〕 口服，每天2次，连用3付。

〔临床疗效〕 经该院应用后，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县中医院。

产 后 支 气 管 炎

〔处方〕 鱼 腥 15克

紫 叩 3个（去皮）
豆腐汤 1碗

〔制法〕 将鱼腥、紫叩2味药，用火焙干，研成面。

〔用途〕 产后支气管炎。

〔用法〕 口服，用豆腐汤冲服。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 市郊区九连城公社卫生院。

阴 道 滴 虫

〔处方〕 蛇床子 50克
白 矾 15克
青 椒 38粒

〔制法〕 将上述3味药，加水煎煮

20分钟。

〔用途〕 用于阴道滴虫。

〔用法〕 外用，趁热先熏后洗。同时可内服龙胆泻肝丸，日服2次，每次1丸。

〔临床疗效〕 效果很好。

〔处方来源〕 丹东市医药公司。

二

〔处方〕 仙鹤草 500克

〔制法〕 加4~5倍量水煎煮，煎煮液浓缩至500毫升。

〔用途〕 用于阴道滴虫。

〔用法〕 外用，用棉球蘸药液塞入阴道，每日换1次。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

儿 科

小 儿 惊 风

〔处方〕 朱 砂
巴豆霜
琥 珀 各等量
白 面 适量

〔制法〕 将上述3味药研成细面，把白面制成较干的糊状，放冷后，与前3味药均匀搅拌，制成小豆大的丸，即可

〔用途〕 治疗小儿急惊风。

〔用法〕 每日1次，6个月以下的服半丸，1周岁1次服1丸，2~3岁，每次服2丸，5~8岁，每服3丸。

〔临床疗效〕 经该站使用，效果很好。

5 6 7 8 9 10
〔处方来源〕 凤城县凤山公社北山
大队医疗站。

小儿消化不良

一

〔处方〕 烟袋油子 适量

〔制法〕 取烟袋杆内的烟油子，备
用。

〔用途〕 用于小儿消化不良，腹
胀。

〔用法〕 外用，取烟袋油子少许抹
在患儿肚脐内，然后用手指按揉 2 ~ 3
次。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效
果良好。

〔处方来源〕 岫岩县新甸公社医
院。

二

〔处方〕 白扁豆
山 药
甘 草
苍 术
鸡内金 各等量

〔制法〕 干燥后，共为细粉。

〔用途〕 用于小儿脾虚，消化不良。

〔用法〕 内服，每日 3 次，每次 1
匙，周岁小儿每次服 0.5 克。

〔临床疗效〕 经该医疗站应用，效
果较好。

〔处方来源〕 岫岩县大营子公社大
营子医疗站。

三

〔处方〕 秦 皮 200 克

黄 柏 200克
〔制法〕 桑皮、黄柏加水煎煮成2000毫升，即得。

〔用途〕 小儿消化不良。

〔用法〕 灌肠，1次30~70毫升。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县汤沟公社东兴合作医疗站。

四

〔处方〕	红 参	100克
	神 曲	150克
	焦 楂	100克
	麦 芽	100克
	槟 榔	100克
	白 术	200克
	枳 实	100克

内 金 300克
青 皮 100克
〔制法〕 将上药混合粉碎，过100目筛，搅匀即得。

〔用途〕 小儿脾虚食滞，虫积消化不良。

〔用法〕 每日3次，每次2.5克~5.0克。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 丹东市中医院。

五

〔处方〕	猪骨头炭	500克
	黄瓜藤	500克
	麦牙粉	500克

〔制法〕 将上述3味药，共为细粉，以水泛丸，豆粒大小。

〔用途〕 小儿消化不良，腹泻，急性肠炎。

〔用法〕 1岁3~5粒，每天2~3次。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 凤城县红旗公社沈甸医疗站。

六

〔处方〕 榆树（黄）蘑 适量

〔制法〕 取水一小碗，把蘑菇用非铁器煎煮1小时，取出蘑菇，加糖。红痢加红糖，白痢加白糖，一次服用。

〔用途〕 小儿腹泻。

〔用法〕 日服2次，连服2日。

〔临床效果〕 经该站临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 宽甸县八河川公社马路沟合作医疗站。

夜 尿 症

〔处方〕	金樱子	15克
	兔丝子	15克
	覆盆子	15克
	韭菜子	15克

〔制法〕 将上述4味药，加水煎煮2次，每次1小时，过滤，合并2次滤液。

〔用途〕 用于夜尿症。

〔用法〕 内服，每日1付，2次分服。连服3日。

〔临床疗效〕 经该院治疗应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县哨子河公社医院。

二

〔处方〕 硫 磺 50克

葱须（新鲜） 适量

〔制法〕 硫磺研成粉末，合并葱须捣成糊状。

〔用途〕 用于遗尿症。

〔用法〕 外用，将上述药用敷料贴肚脐。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 凤城县中医院。

三

〔处方〕 沙苑子 15克
覆盆子 15克

韭菜子 15克

金樱子 15克

〔制法〕 将上述4味药，加水煎煮3次。

〔用途〕 用于小儿夜尿症。

〔用法〕 内服，每日1剂，日服3次。

〔临床疗效〕 经该医疗站应用，效果较好。

〔处方来源〕 凤城县沙里寨公社医疗站。

四

〔处方〕 乌 药
益智仁 各等量

〔制法〕 上述2味药，共用细粉，水泛小丸。

〔用途〕 用于小儿夜尿症。

〔用法〕 内服，每日2次，每服3～5克，白水送服。

〔临床疗效〕 经该医疗站应用，效果较好。

〔处方来源〕 凤城县沙里寨公社蔡家医疗站。

小 儿 脱 肛

〔处方〕 香椿树根 100克

瘦鲜猪肉 100克

〔制法〕 先将香椿树根洗净，切碎，加1000毫升水煎煮至500毫升，晚间拿室外放露一夜，第二天早拿回，放入猪肉将肉煮熟汤约200毫升左右即可。

〔用途〕 用于小儿脱肛。

〔用法〕 内服，吃肉喝汤。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

二

〔处方〕	银 珠	5 克
	儿 茶	10克
	冰 片	2.5克
	轻 粉	1.5克
	枯 矾	2.5克
	五倍子	5 克

〔制法〕 将上述6味药，共为细末。

〔用途〕 用于小儿脱肛，外痔。

〔用法〕 取适量药粉涂于患处，按摩送入。手法复位。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县岭沟公社山城

大队医疗站。

蛲 虫 病

一

〔处方〕 汽 油 适量

〔制法〕 取一股洁净的汽油即可。

〔用途〕 用于小儿蛲虫症。

〔用法〕 外用，将棉花蘸上汽油，塞入肛门。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

二

〔处方〕 大红枣 1个

山道年片 (按年龄计算用量)

〔制法〕 将红枣捣烂，驱虫药片研碎，混合一起，做成栓剂。

〔用途〕 治疗小儿蛲虫症。

〔用法〕 将栓剂放入肛门即可。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县新甸公社医院。

三

〔处方〕 雄 黄 15克

胆 矾 5克

〔制法〕 将2味药，研为细粉。

〔用途〕 治疗小儿蛲虫症。

〔用法〕 用纱布沾药粉，塞入肛内。每次0.25克。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

20 1 2 3 4 5
〔处方来源〕 凤城县汤山城公社医院。

小 儿 疝 气

〔处方〕 白 古 月 10克
干 姜 2.5克
肉 桂 2.5克
附 子 5克

〔制法〕 将上述4味药研成细粉，加白面25克，用醋适量调匀，成为糊状。

〔用途〕 用于小儿疝气。

〔用法〕 外用，将药摊在纱布上贴于辜丸硬核处，药干再用醋调，连敷2~3天，每一周为一疗程。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 东沟县新立公社卫生院。

〔注〕 贴此药局部有痛感，敷第二次疼痛减轻。

小 儿 胎 毒

〔处方〕 黄甘油 适量

〔制法〕 取一般做润滑用的洁净黄甘油即可。

〔用途〕 用于小儿胎毒。

〔用法〕 外用，敷于患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 岫岩县大营子公社王堡大队医疗站。

二

〔处方〕 楸树皮
青木香
黄柏 各等量

〔制法〕 将上述3味药，研为细粉。用香油或豆油调成膏状。

〔用途〕 治疗小儿胎毒。

〔用法〕 将药膏敷于患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果良好。

〔处方来源〕 宽甸县夹皮沟公社夹皮沟医疗站。

三

〔处方〕 枯矾 25克
松香 10克
铅粉 10克

冰片 10克

蜂房 1个

〔制法〕 将蜂房焙干，其余研末，用香油调敷。

〔用途〕 小儿胎毒，癣疮。

〔用法〕 取适量药膏敷于患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 岫岩县前营子公社新电大队医疗站。

〔注〕 铅粉有毒，不可过量。

腮腺炎

一

〔处方〕 青黛 25克
冰片 2.5克

〔制法〕 将上述2味药，共为细

末。

〔用途〕 用于腮腺炎。

〔用法〕 外用，用水调成糊状，敷于患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 东沟县新沟公社医院。

二

〔处方〕 仙人掌 适量

白 矾 适量

〔制法〕 将仙人掌和白矾，捣烂。

〔用途〕 用于腮腺炎，多发性疖肿。

〔用法〕 成糊状敷于患处。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市中医院。

三

〔处方〕 红小豆 50克

〔制法〕 加水煮熟。

〔用途〕 用于腮腺炎。

〔用法〕 将豆捣烂敷于患处，同时喝煮豆汤，日服1次。

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果较好。

〔处方来源〕 岫岩县岭沟公社医院。

四

〔处方〕 鲜蒲公英 适量

白 矾 适量

〔制法〕 将蒲公英和白矾捣烂。

〔用途〕 用于腮腺炎。

〔用法〕 成糊状敷于患处。

20 1 2 3 4 5 6

〔临床疗效〕 经该院临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第二医院。

五

〔处方〕 鲜土豆 适量

明 矾 15克

〔制法〕 土豆加明矾捣烂。

〔用途〕 用于腮腺炎，多发性疖肿。

〔用法〕 成糊状后敷于患处。

〔临床疗效〕 经该站临床应用，效果很好。

〔处方来源〕 市郊区抗美医疗站。

六

〔处方〕 板兰根 25克

连 翘 20克

地 丁 20克

双 花 20克

蒲公英 20克

甘 草 15克

皂 刺 20克

〔制法〕 将上7味药加水煎煮。

〔用途〕 用于腮腺炎。

〔用法〕 口服2次，每天1剂。

〔临床疗效〕 经该院临床应用效果很好。

〔处方来源〕 丹东市第一医院

〔注〕

如双花没有，可用双花藤代替。

毒剧药品参考表

(一) 毒药

品名	别名	性味	功用	主治	用量	注意
红信石	砒红土 霜砒信	辛酸、 大热、 有大毒。	祛痰、截 疟、杀虫、 蚀腐肉。	哮喘、疟疾、梅毒、 毒：外用治痔漏 及蚀腐肉不脱。	0.15~ 0.25克。 外用适 量。	大毒之品，凡 之宜慎。不宜 内服体虚及孕 妇忌用。
白信石	白砒	同上	同上	同上	同上	同上
轻粉		辛寒燥 烈，有毒。	杀虫、 消积、 劫毒。	疥癣、疥瘡、梅毒、 内服治痰 积、水肿、 疔毒。	每日 0.15~ 0.20克。 分次 服。	内服极宜 慎。只宜配 成丸散。用 小剂量。孕 妇忌用。
红粉	升药 升丹	有毒。	去腐生肌。	治一切疮疡、 拔毒、去腐、生 肌、长肉、疮口 坚硬、内陷、紫黑。	为外用 药， 适量。	常单独应用 于较严重创 患。

白降丹		味烈， 有毒。	同上	同上	同上	同上
雄黄	王月海 黄黄	性寒， 味酸， 有毒。	杀虫、 辟毒。	疔毒、瘰癧、无 名肿毒（用醋 煎）	0.05~ 0.10、 0.15与 最大极 量。外用 适量。	本品有毒， 过量可致 死，不可不 慎。
密陀僧	炉底 陀僧 全陀僧	性平、 有毒。	杀虫、 敛疮、 生肌。	一切瘡毒、全瘡 不收口者。 内服治皮肉病 等症。	0.25~ 0.75克。 外用通 量。	本品有毒， 内服少用， 外用者应 慎用。
生马钱子		苦寒， 有毒。	散血热， 消肿毒。	伤寒热病，咽喉 肿痛，瘰癧、 疔毒、恶疮等症。	炙品， 1~2 克。	体虚者忌 用。
巴豆		辛热， 大毒。	峻下寒 积，逐水， 行痰。	寒积、停饮、胸腹 胀满、急痛、水 肿、痰饮、外用 治疔毒。	0.25克	本品有毒， 不可内服， 凡用不可不 慎。外用亦 忌。

(二) 剧药

品名	别名	性味	功用	主治	用量	禁忌
生甘遂	猫儿眼	苦寒，有毒。	泻水，通便。	水肿胀满，痰饮积聚，胸满短气等症。	2.5~5克，炮制品。	体虚弱及孕妇禁用。
狼毒	猫眼根	辛平，有毒。	祛痰，杀虫，止痛。	痰饮积聚，咳嗽逆气，胸腹疼痛；外用治皮肤疥癣，杀一切植物的害虫。	炮制品，1.5~4克。外用适量。	本品有大毒，内服慎用。
大戟		苦寒，有毒。	泻水，通便。	水肿胀满，痰饮积聚。	炮制品，2.5~5克。	体虚弱者及孕妇禁用。
芫花		苦寒。	泻水，通便。	水肿胀满，痰饮积聚，咳嗽逆气等症。	炮制品，2.5~5克。	非壮实者不宜，孕妇忌用。

洋金花	曼陀罗花	辛温，有毒。	麻醉止痛，祛风湿，平喘咳。	内服止一切疼痛，煎汤洗，治风湿脚气；又内服或揉碎作烟服治哮喘，忌咳。	炮制品，0.1~0.3克。	本品有毒，内服宜慎，体弱者禁用。
闹洋花	闹阳花	味辛，有毒。	镇静，麻醉。	为杀虫药及土农药。		
天仙子		甘温，有毒。	镇疼，止痛。	癫狂，抽搐，癔病，胃痛，喘咳，久咳，久痢，久泻，外敷痈肿恶疮等症。	1~2克，外用适量。	有毒，内服宜慎。
红娘子		苦平，有毒。	破瘀，解毒。	瘀阻，经闭，症瘕，疔疮，恶疮，外治疥癣恶疮，疔，	中个1~2个，外用适量。	体弱及孕妇禁用。

品名	别名	性味	功用	主治	用量	禁忌
水银	汞	辛、寒，有毒。	杀虫。	皮肤疥癬，梅毒等症。并能除虱。	本品以外用为主，适量。	大毒之品，不宜内服，足宜慎用。
生川乌	乌头	味辛甘、有大毒。	搜风燥湿、祛寒。	风寒湿痹，关节拘挛，手足不遂，大寒腹痛等。	炮制品，1.5~4克	凡明虚阳亢者用
生草乌	草乌	辛、苦、热，有大毒。	散寒止痛。	同上	同上	同上
生半夏	小天老星	辛、温。	燥湿化痰，降逆止呕。	脾胃失健，痰饮咳嗽，胸膈满，呕吐不食等症。	炮制品，7.5~15克	阴虚津液不足者忌用。

生南星	山苞星	辛、温，有毒。	燥湿化痰，降逆止呕。	口眼歪斜，半身不遂，破伤风，小兒惊风，痰厥，外敷可肿。	炮制品，0.4~5克。外用适量。	同虚有痰者忌用。
生附子		味辛甘，有大毒。	同川乌。	大汗亡阳，四肢厥逆，霍乱转筋，阳虚畏寒自汗，心腹冷痛等症。	炮制品，5~15克。	同川乌。
生天雄		同上	同上	同上	炮制品，2.5~7.5克。	同川乌。
官粉	铅官粉 粉粉钙	味辛、寒。	杀 虫、解毒。	外用，治一切无名肿毒，火灼，鼠咬等症。	外用适量。	

山名	别名	性味	功用	主治	用量	禁忌
斑蝥		辛寒，有毒。	除血积，蚀死肌，利尿攻毒。	淋病，疯狗咬伤，外用治恶疮疥癣等症。	炮制品，中个1~2个，外用不宜多。	体虚及孕妇忌用。
虻虫	虻蛭	苦寒，微有毒。	破瘀血，消结，通经。	经闭症瘕，蓄血等症。	0.5~1.5克。	体虚弱，无瘀积及孕妇禁用。
水蛭	马蛭	咸苦，有毒。	通经，破瘀，消肿。	月经闭止，症瘕，腹痛，蓄血，伤瘀血作痛，肿丹毒等症。	炮制品，5~10克。	非瘀滞实证及孕妇忌用。
蜈蚣		甘辛，温，有毒。	解毒，止痛，止痒。	痈疽恶疮，疔毒，牙痛，咽喉肿痛等症。	内服入丸散，随配方，外用无定量。	体虚弱者忌用。

罂粟壳	人烟葫芦	酸涩微寒。	敛肺止咳，止汗，止泻，止痛。	久咳不止，久泻，久痢，脱肛，弱，虚汗等症。	5~10克。	有外邪郁热者不宜。
胆矾		酸辛，寒，有小毒。	能吐，燥湿，杀虫，消积。	风热痰涎，中寒，咽喉，癰疽，食物中毒；外用治口疮，风眼赤烂，痒疮，疥癣等症。	0.25~0.75克，外用适量。	体弱也者忌用。
硝石	火硝	性寒味咸苦。	泻火，软坚，破瘀，实热。	肠胃实热，积滞，停痰，宫冷等症。	炮制品，5~15克。	胃虚无实者及孕妇忌用。

中草药采集季节参考表

(一) 春季采集的中草药

1、根、根皮及地下茎类：

龙胆、秦艽、白薇、徐长卿、紫草、丹参、玄参、茜草、北重楼、藜芦、黄芩、羊乳、海州常山、托盘、黄芪、葛根、苦参、远志、狼毒、白芷、独活、柴胡、防风、紫菀、南沙参、党参、漏芦、青木香、羊蹄、赤芍、银柴胡、威灵仙、土白芍、小蘗、山豆根、三棱、天麻、天南星、百合、薤白、地骨皮、接骨木（根皮）、桑白皮、香加皮、白鲜皮、蛇白皮、五加皮、刺老牙（根皮）、椿皮、地黄、玉竹、芦根、射干、穿地龙、知母、黄精、白茅根、贯众、水菖蒲、波叶大

黄、手掌参、藜本、苍术、拳参、升麻、白头翁、天花粉。

2、全草、茎、枝、叶及皮类

(1) 全草：铃兰、地丁、蒲公英、冰凉花、委陵菜。

(2) 茎枝叶：鸡树条（叶、嫩枝）、箭羽（枝）、文冠果（茎叶）、刺南蛇藤。

(3) 地上部分：卷柏、连钱草、茵陈。

(4) 皮类：秦皮、黄柏。

3、花及花粉类： 松花粉。

4、果实和种子类： 槐角。

5、动物类

瓦楞子、海螵蛸、海螺、蛤壳、地龙、全蝎、蛇蜕、桑螵蛸。

6、其他类： 猪苓。

(二) 夏季采集的中草药

1、根、根皮及地下茎类

地榆、毛黄连、商陆、接骨木、椿皮、牡丹皮、落新妇、两头尖、半夏、延胡索、天花粉、平贝母。

2、全草、茎、枝、叶及皮类

(1) 全草：列当、车前草、土三七、细辛、藜芦、斩龙剑、伸筋草、浮萍、泽兰、盘龙参、蓬子菜、龙葵、睡菜、石韦、野西瓜苗、小蓟、斩龙草、蒲公英、刺针草、山梗菜、东方蓼、漏斗菜、星星草、穿叶蓼、白屈菜、委陵菜、风仙花、松萝、黄柏(皮)、飞燕草。

(2) 地上部分：藿香、香薷、荆芥、

刘寄奴、鸭跖草、益母草、问荆、野薄荷、猪毛菜、芥、律草、透骨草、角蒿、老头草、老鹤草、木贼、红旱莲、鼠曲草、大蓟、豨签草、篇蓄、马齿苋、瞿麦、血见愁、瓦松、仙鹤草。

(3) 茎、枝、叶：鸡树条、大青叶、艾叶、文冠果(茎叶)、北重楼(茎叶)、海州常山(叶)、类叶牡丹(叶)、西河柳(嫩枝)、青蒿(茎叶)、荷叶、蓖麻(叶)、淫羊藿(叶)、白扁豆(叶)、花楸(茎皮)水辣蓼(茎叶)、洋金花(叶)、莨菪。

3、花及花粉类

凤仙花、莲须、莲花、洋金花、金银花、马蔺花、蒲黄(花粉)、刺玫、啤酒花、葛花、旋复花、玉簪。

4、果实及种子类

枸杞子（果）、鹤虱（果）、夏枯草（果穗）、天仙子、车前子、桑椹（果穗）、山核桃（青果）、花楸（果实）、桃仁、杏仁、水辣蓼（果实）、葶苈子（种子）、白芥子、王不留行（种子）、急性子。

5、动物类

土鳖虫、蝼蛄、蜗牛、地龙、全蝎、斑蝥、石决明、海螵蛸、海螺、蝉蜕、蟾酥、虻虫、蛇蜕。

6、其他类

猪苓、麦角、五倍子。

（三）秋季采集的中草药

1、根、根皮及地下茎类

秦艽、龙胆、白薇、徐长卿、紫草、丹参、玄参、茜草、北重楼、藜芦、桔梗、麻黄、萱草、黄芩、板蓝根、海州常山、羊乳、类叶牡丹、地榆、葛根、苦参、远志、狼毒、北沙参、白芷、独活、柴胡、防风、人参、南沙参、党参、紫菀、漏芦、银柴胡、羊蹄、威灵仙、赤芍、土白芍、白头翁、小蓟、毛黄连、山豆根、商陆、菊三七、牛膝、东当归、白芷、黄芪、地骨皮（根皮）、地黄、缬草、桑白皮（根皮）、败酱、玉竹、射干、穿地龙、知母、黄精、白茅根、芦根、水菖蒲、贯众、香加皮（根皮）、波叶大黄、手掌参、白首乌、甘草、白鲜皮、蛇白薇、五加皮（根

7 8 9 20 1 2
皮)、刺老牙(根皮)、藁本、苍术、拳参、升麻、山药、牡丹皮(根皮)、三棱、土贝母、香附子、百合、天麻、薤白、半夏、天南星、孩儿参、草乌、白附子、禹白附、山椒、托盘、飞燕草、瓜蒌、马兜铃。

2、全草、茎、枝、叶及皮类

(1) 全草：松萝、当药、细辛、伸筋草、铃兰、盘龙参、蓬子菜、通经草、星星草、龙葵、兔儿伞、睡菜、香茶菜、野西瓜苗、蒲公英、小蓟、穿叶蓼、白屈菜、紫苏、飞燕草。

(2) 地上部分：香薷、荆芥、斩龙剑、问荆、木贼、益母草、卷柏、野薄荷、泽兰、角蒿、老鹤草、红旱莲、野菊花、大蓟、鼠曲草、老头草、马齿苋、瞿麦、瓦松、仙鹤草。

(3) 茎枝叶：麻黄(茎)、关木通(茎)、刺南蛇藤(茎)、马兜铃(茎)、洋金花(叶花)、忍冬藤(茎枝)、桑叶、桑枝、板蓝根(叶)、珍珠梅(茎皮)、箭羽(嫩枝)、西河柳(嫩枝)、满山红(叶)、淫羊藿(叶)、山皂角(棘针)、花楸(茎皮)。

3、花及花粉类

啤酒花、东北蛔蒿(花蕾)、鸡冠花、款冬花。

4、果实及种子类

鹤虱、梓实、鸡树条、赤包、山核桃、刺玫果、托盘、山椒、合欢、蛇床子、牛蒡子、苍耳子、蒺藜、风眼草、北皂角、马兜铃、水红子、地肤子、五味子、山楂、瓜蒌、酸浆、菟丝子、天仙子、车前子、

火麻仁、马蔺、柏子仁、白果、益母草、野亚麻、沙苑子、萝藦、桃仁、杏仁、酸枣仁、冬葵子、郁李仁、芡实、急性子、牵牛子、青箱子、草决明、补骨脂、茴香、白芥子、蓖麻子、黑芝麻、白扁豆、王不留行、胡卢巴、薏苡仁、花楸。

5、动物类

土鳖虫、瓦楞子、石决明、海螺、蛤壳、蝉蜕、斑蝥、全蝎、田鸡油、地龙、蜗牛、蜈蚣、虻虫、桑螵蛸。

6、其他类

猪苓、马勃、麦角。

(四) 冬季采集的中草药

麻黄(根)、忍冬藤、关木通(茎)

珍珠梅(茎皮)、满山红(叶)、野菊花(花、地上部分)、槐角、萝藦(种子)、田鸡油、蜂房。

(五) 四季可采的中草药

接骨木(茎枝)、桑枝、侧柏叶(枝)、油松节(枝节)、松针、牡蛎、刺蝟皮、鸡内金、暴马子、胆汁、黄柏、秦皮、寄生、珍珠梅、石韦、麦芽、桑螵蛸、滑石、鸡蛋壳、牛黄、鹿茸、鹿角、胎盘、熊胆、蛇皮、獾油、陈皮。